

Aus der Königlichen Universitäts-Frauenklinik zu Breslau.
Direktor: Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Küstner.

Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1903/04 bis 1907/08.

Inaugural-Dissertation

der

Hohen Medizinischen Fakultät der Kgl. Universität
Breslau

zur


Erlangung der Doktorwürde

in der

Medizin und Chirurgie

vorgelegt von

Stefan Kohn.



Breslau 1908.

Druck der Breslauer Genossenschafts-Buchdruckerei, E. G. m. b. H.

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät der
Universität Breslau.

Referent: Professor Dr. Küstner.

Bonhoeffer, Dekan.

Da mir einerseits die Fortsetzung der Statistik der Geburten bei engem Becken überlassen wurde und ich andererseits imstande bin, dieselbe zu beendigen, das heisst, die Geburten bis zum Jahre 1907/08 zu beschreiben, so halte ich es für möglich, nach der Benutzung meines ziemlich umfangreichen Materials und nach Vergleichung der Resultate meiner drei Vorgänger (Heinsius 1894/95 bis 1896/97, Kretschmer 1897/98—1899/1900, Kapischke 1900/01—1902/03), ein anschauliches und ausführliches Bild der Leistung der Klinik während eines grossen Zeitraums darzustellen, mit Rücksicht auf die verschiedenen Änderungen in der Therapie und in den wissenschaftlichen Überlegungen.

Um aber etwaige Schlüsse aus dem Material zu ziehen, müssen wir von Anfang an wissen, was für ein Ziel wir verfolgen, in welcher Ordnung wir vorgehen und wie wir unser Material gruppieren wollen. Wir haben folgendes Material zur Verfügung: Heinsius 139, Kretschmer 110, Kapischke 346 und Kohn 322 Fälle. Zusammen: 917 Fälle.

Bei der Benutzung dieses Materials werde ich den Prinzipien folgen, die Baisch in seiner Schrift: „Reformen in der Therapie des engen Beckens“ aufgestellt hat, nämlich: die Mortalität und Morbidität der Mütter und Kinder bei verschiedenen Arten der Geburtsleitung zu verzeichnen. Dabei halte ich es für notwendig, folgende Fragen, die auch Baisch aufgestellt hat, zu beantworten:

1. Wie gross ist die kindliche Mortalität, wenn die Geburt streng exspektativ, nur im Interesse der Mutter geleitet wird?
2. Wie gross ist die Häufigkeit der Spontangeburt bei dieser exspektativen, ausschliesslich die Mutter berücksichtigenden Geburtsleitung?
3. Wie verschiebt sich Mortalität und Morbidität von Mutter und Kind, wenn in dies streng abwartende Verfahren, das nur Spontangeburt und Perforation kennt, die Zange, prophylaktische Wendung bezw. Wendung und künstliche Frühgeburt eingeschaltet werden?
4. Sind diese Operationen imstande die Perforation des lebenden Kindes zu ersetzen oder wenigstens einzuschränken und den relativen Kaiserschnitt, sowie die beckenenerweiternden Operationen zu umgehen?
5. In welchem Umfang müssen wir von Kaiserschnitt und Hebosteotomie Gebrauch machen, wenn wir das Ideal der Geburtshilfe, auch das Kind in jedem einzelnen Falle zu retten, erreichen wollen?

Nach genauer Besprechung dieser Fragen werde ich die Gesamtergebnisse in einer Orientierungstabelle am Schlusse der Arbeit zusammenstellen.

Ausser diesen speziellen Bedingungen statistischer Natur sind diejenigen Momente zu berücksichtigen, die einen wesentlichen und bestimmten Einfluss auf den Geburtsverlauf und die Prognose für Mutter und Kind ausüben, nämlich: Grösse der Frucht, erste oder wiederholte Schwangerschaft.

Was die Grösse des Beckens anbetrifft, so habe ich, ebenso wie Heinsius, zu den verengten diejenigen gerechnet, bei denen c. v. von 9,5 oder darunter vorlag. Kretschmer und Kapischke haben in ihrer Statistik auch diejenigen von c. v. = 10 angeführt. In den Vergleichungsergebnissen lasse ich dieselben unberücksichtigt. Dabei muss ich noch bemerken, dass ich in den Fällen, wo nicht mit dem Küstnerschen Verazirkel gemessen

wurde, die c. v. durch Abrechnung von 2 cm von der c. d. bestimmt habe. In den Fällen aber, wo direkt mit Küstnerschem Verazirkel gemessen ist, ist die c. d. nicht berücksichtigt worden. Die angegebenen Querdurchmesser des Beckens sind zum Teil dem klinischen „Enges Becken Buch“ entnommen, zum Teil aus den Krankengeschichten. Dieselben sind gefunden mit dem bekannten, von Küstner angegebenen Zirkel. Die grösste Beckenverengung, die in diesem Zeitraum beobachtet worden ist, ist c. v. = $5\frac{3}{4}$.

In meiner Arbeit lege ich einen grösseren Wert auf die exakte Beckenmessung, als auf die Form des Beckens einerseits deswegen, weil viele von den Fällen in der Poliklinik vorgekommen sind, wo die genaue Beobachtung der Kreissenden erschwert ist, und andererseits, weil die zwei Hauptkategorien: allgemein verengtes und plattes Becken bei der genauen Beckenmessung sowieso leicht ins Auge fallen.

Bei einer Einteilung des Materials in bezug auf Ätiologie der verschiedenen Beckenformen würden wir mit so viel Möglichkeiten zu tun haben, dass die durch ihre Vielseitigkeit schon sowieso komplizierte Arbeit in ihren Endzwecken noch mehr verdunkelt würde.

Jedenfalls will ich der Vollständigkeit halber einen kurzen Überblick über die Ursachen der fehlerhaften Beckenbildung in 115 Fällen, die dem klinischen Material entnommen sind, geben:

Es fanden sich Rhachitis (spät laufen gelernt) in
52 Fällen = 45,21 %.

Tbc. in 18 Fällen = 15,65 %.

Chlorose in 9 Fällen = 7,82 %.

Nichts besonderes war zu ermitteln in 36 = 31,3 %.

Rhachitis und Tbc. zugleich 4 = 3,47 %.

In dieser Arbeit sollen auch die Fälle mitgeteilt werden, bei denen die c. v. oder c. d. nicht angegeben war, wo aber der Geburtsverlauf deutlich zeigte, dass man es mit einem engen Becken zu tun hatte; sowie diejenigen Fälle,

bei denen die innere Untersuchung irgend eine Verengerung ergeben hat. Die Endresultate werde ich nur aus den Fällen berechnen, bei denen die c. v. oder c. d. angegeben war, weil ich bei so viel feinen Differenzen und so verschiedenen Schattierungen, die ein enges Becken verursachen kann, den Diameter Beadeloquii als viel zu ungenügend erachte, um daraus sichere Schlüsse zu ziehen. Die engen Becken, die den Kategorien der schrägverengten, spondylolisthetischen, osteomalazischen, Tumorenbecken usw. angehören, werden speziell beschrieben, wenn sie auch in der Krankengeschichte speziell berücksichtigt worden sind. Ausser der Hauptorientierungstabelle werde ich mich bemühen, einige vielleicht etwas unklar in derselben beschriebene Punkte nochmal detailliert zu beschreiben.

Das Material gruppire ich in derselben Weise, wie Kretschmer und Kapischke, indem ich nämlich allmählich von den Graden der geringeren Verengerung zu den grösseren übergehe. (c. v. = 9,5—8,5, c. v. = 8,4 bis 7,5, c. v. = 7,4—6,5, c. v. = 6,4—5 $\frac{3}{4}$.) Jede einzelne dieser Rubriken theile ich noch nach den Erst- und Mehrgebärenden und nach der Art der Hilfeleistung ein. Beim Wochenbettverlauf ist zwischen gestörten und kranken Wochenbetten zu unterscheiden. Als gestört werden diejenigen Wochenbette bezeichnet, in denen nur eine einmalige Temperatursteigerung über 38,5° C. auftrat; als krank dagegen die, bei denen diese Steigerung länger anhielt oder sich wiederholte.

Erklärungen zu dem Verzeichnis der Fälle.

Pol. = der Fall ist dem poliklinischen Material entnommen.

Kl. = der Fall ist dem klinischen Material der geburtshilflichen Station entnommen.

Gyn. = der Fall ist dem Material der gynäkologischen Station entnommen.

c. ext. = conjugata externa.

Die unter der Rubrik „Beckenmasse“ angegebenen Zahlen beziehen sich von links nach rechts gelesen auf *distantia spinarum*, *cristarum*, *coningata externa* und *coningata diagonalis*.

sp.i. = *distantia spinarum iliacarum*.

cr.i. = *distantia cristarum iliacarum*.

c. d. = *coningata diagonalis*.

c. v. = *coningata vera*.

B.E. = Beckeneingang nicht unter.

B.M. = Beckenmitte nicht unter.

B.W. = Beckenweite nicht unter.

B.A. = Beckenausgang nicht unter.

B.enge = Beckenenge nicht unter.

K. = Kind.

G. = Gewicht.

L. = Länge.

K.U. = Kopfumfang.

Sch.U. = Schulterumfang.

Gr.D. = gerader Durchmesser des Kopfes.

Gr.Schr. = grosser schräger Durchmesser des Kopfes.

Kl.Schr. = kleiner schräger Durchmesser des Kopfes.

Gr.qu. = grosser querer Durchmesser des Kopfes.

Kl.qu. = kleiner querer Durchmesser des Kopfes.

M. = Mädchen.

K. = Knabe in der Rubrik „Kind“.

Vera 9,5—8,5.

Lide. No., Jahrgang; Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Ge- burt's dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
------------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------------------------	-------------

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

1. 03/04. Kl. 321 (163)	24	I. p. Gelenkrheu- matismus	24 29 20 10 ¹ / ₂ c.v. 9 ¹ / ₂	—	II. Schl.	—	12	—	normal	K. 3670, L. 53, K.U. 37, Sch. U. 38, Gr. D. 10 ¹ / ₂ , Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 11, Gr. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt
2. 04/05. Kl. 312 (170)	21	I. p.	19 23 20 11 ¹ / ₂	—	II. Schl.	—	24	—	normal	M. 2650, L. 50, K.U. 33, Sch. U. 33, Gr. D. 10 ¹ / ₂ , Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 9, Gr. qu. 8, Kl. qu. 6 ¹ / ₂	—	Spontangeburt
3. 04/05. Kl. 507 (176)	22	I. p.	22 ¹ / ₂ 27 19 10 ¹ / ₂ —11	—	II. Schl.	—	6 ¹ / ₂	—	Übel- riechende Lochien, sonst o. B. Status afebrilis	M. 2170, L. 46, K.U. 31, Sch. U. 32	—	Rhachitis, Spontangeburt
4. 06/07. Kl. 629	22	I. p. Vater an Tbc. †	25 28 20 11 ³ / ₄ c.v. 10 ¹ / ₄	—	II. Schl.	—	11	—	o. B.	M. 3380, L. 51, K.U. 35, Sch. U. 40, Gr. D. 11, Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9,	—	Spontangeburt

5. 06/07. Kl. 634	19	I. p. vor 5 Jahren Rheumatis- mus	25 20 11—11 ¹ / ₂ c. v. 10—10 ¹ / ₄	—	II. Schl.	—	—	—	o. B.	L. 48, K. U. 35, Sch. U. 36, Gr. D. 11 ¹ / ₂ , Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 9 ¹ / ₂ , Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Spontangeburt
6. 06/07. Kl. 769	19	I. p. Rhachitis	25 29 19 ¹ / ₂ 11 ¹ / ₂	—	II. Schl.	—	50	—	o. B.	K. 3170, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Spontangeburt
7. 07/08. Kl. 426	24	I. p.	24 27 20 11 c. v. 8 ³ / ₄	—	II. Schl.	—	29	—	o. B.	K. 3400, Sch. U. 30, Gr. D. 12, Gr. Schr. 13 ¹ / ₂ , Gr. qu. 8 ¹ / ₂	Spontangeburt
8. 07/08. Kl. 521	17	I. p.	22 24 28 11 ¹ / ₄ c. v. 9,5 B.M. 10 B.A. 8	—	I. Schl.	—	10	—	ungestört, T. 37,2 ⁰ am 2. Tage	M. 2890, L. 49,5, K. U. 35, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9	Spontangeburt
9. 07/08. Kl. 398	23	I. p.	25 29 18 ¹ / ₂ 10 ¹ / ₂ c. v. 9 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	18	—	normal, Clitoris gut geheilt	K. 2700, L. 47, K. U. 33, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 8,5	Spontangeburt, Clitoriss.
10. 07/08. Kl. 561	29	I. p. Vater an Tbc. +, Skrophulose	24 28 18 10 ¹ / ₂	—	I. Hinter- haupts- lage	—	20	—	ungestört, 37,4 ⁰ am 9. Tage	K. 2200, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 35, Gr. D. 12, Gr. Schr. 14, Gr. qu. 9	Spontangeburt

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
11. 05/06. Kl. 494	23	I. p. mit 4 Jahren laufen gelernt	26 $\frac{1}{2}$ 14 $\frac{1}{2}$ c. d. = v. ob. Prom. 9 $\frac{3}{4}$ v. nat. Prom. 9 $\frac{1}{2}$ c. v. 9 $\frac{3}{4}$	—	I. Schl.	—	12	—	im 10. und 11. Tage T. bis 39 $\frac{0}{0}$. Vom 1.—10. Tage T. bis 38 $\frac{0}{0}$	M. 3160, K. U. 33, Sch. U. 38	Dammnath	Spontangeburt
12. 07/08. Kl. 346	23	I. p.	25 27 $\frac{1}{2}$ 18 10 c. v. 8 $\frac{1}{2}$	—	II. Schl.	—	10	T. 37,3	leicht fiebrhaft (37,8 am 8. und 9. Tage)	M. 2960, L. 50, K. U. 35, Sch. U. 34, D. Gr. 12, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 8 $\frac{1}{2}$, Kl. qu. 7	Walchersche Hängelage	Spontangeburt
13. 07/08. Kl. 393	20	I. p. Vater an Tbc. †	25 28 18 $\frac{1}{2}$ 10 c. v. 9	—	I. Schl.	vor- zeitig	—	—	am 10. Tage T. 37,9	M. 2200, L. 47, K. U. 31, Sch. U. 30, Gr. D. 10, Gr. Schr. 12, Gr. qu. 8	Crédé	Spontangeburt
14. 07/08. Kl. 760	28	I. p. Rhachitis	22 26 16,75 11,1	—	II. Schl.	—	6	—	leicht fiebrhaft (38 $\frac{0}{0}$ am 5. Tage). Riecheude Lochien	M. 3100, L. 50, K. U. 33, Schr. 34, Gr. D. 11, Schr. 13, Kl. Schr. 3 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 10,	—	Spontangeburt
15. 07/08. Kl. 787	20	I. p.	25 26 16 10 $\frac{1}{4}$ c. v. 9 $\frac{1}{4}$ B. E. 12 B. M. 10 B. A. 10 $\frac{1}{2}$	—	I. Schl.	—	8	—	ungestört	K. 3380, L. 51, K. U. 36, Schr. U. 38, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9,75,	—	Spontangeburt

Zange.

16. 06/07. Kl. 620	16	I. p.	23 25 19 10 ^{9/4} c. v. 9 ^{1/4} —9 ^{1/2}	—	I. Schl.	—	11	Albuminurie. Herzfehler. Drohende Asphyxie	normal	K. 3800. L. 52, K. U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 8, Kl. qu. 7.	Zange	—
17. 06/07. Kl. 603	23	I. p. Rhachitis	c. d. 11 ^{1/4} c. v. 9 ^{1/4} —9 ^{1/2}	—	II. Schl.	—	—	—	normal	K. 2770, L. 48, K. U. 34, Sch. U. 34, Gr. D. 10, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9 ^{1/2} , Kl. qu. 7 ^{1/2} .	Zange bei tiefem Quer- stand in Narkose	—
18. 06/07. Kl. 631	28	I. p. Tbc., Herz- fehler	24 27 20 10 ^{1/4} —10 ^{1/2} c. v. 9 ^{1/4}	—	II. Schl.	—	16	T. 37,3. Drohende Asphyxie	v. 6.—13. Tage T. zwisch. 38,6—37,6 ⁰ Entlassg. nach 19 Tagen	K. 3770, L. 53, K. U. 37, Gr. D. 12 ^{1/2} , Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Muttermund- inzisionen, Zange, Crédé	Scheidendammriss II ⁰
19. 06/07. Kl. 631 (226)	28	I. p. Tbc., Herz- fehler	24 27 20 10 ^{1/4} —10 ^{1/2} c. v. 9 ^{1/4}	—	II. Schl.	—	16	T. 37,3. Drohende Asphyxie	v. 6.—13. Tage T. zwisch. 38,6—37,6 ⁰ Entlassung nach 19 Tag.	K. 3770, L. 53, K. U. 37, Gr. D. 12 ^{1/2} , Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Muttermund- inzisionen, Zange, Crédé	Scheidendammriss II ⁰
20. 07/08. Kl. 780 (332)	22	I. p.	24 26,5 16,5 10 ^{3/4} c. v. 9 B. E. 13 ^{1/2} B. M. 12 B. A. 11	—	I. Schl.	—	28	Nabelschnur- vorfall	ungestört	M. †, G. 2820, L. 49, K. U. 30, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9 ^{3/4}	Forceps	Kind totgeboren

Life. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
21. 07/08. Kl. 135 (344)	21	I. p., beide Eltern an Lungenentz. † Rhachitis und Lungenentzdg.	c. d. 10 ^{1/2}	—	I. Schl.	Perforation 48	Nabelschnur- vorfall. Absterben des Kindes		normal	K. † 2270, L. 50	Perforation	†

Pubiotomie.

22. 06/07. Kl. 685 ryn. 656 (385)	20	I. p., Vater an Tbc. †, mit 3 Jahren laufen gelernt	—	—	I. Schl.	—	—	Frucht- wasser- mekonium- haltig, F. 37,6	In den ersten 2 Tagen 38°, von 6–18 Tg. bis 40,6°, dann bis 30 Tg. einzelne Tempe- ratur- steige- rungen bis 38°	K. 2540, L. 49, K. U. 34, Sch. U. 40, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 10. Asphyktisch	Pubiotomie, Zange, Scopalamini † Morphium	Rhachitis. Haematom im linken grossen La- bium. Entlassungsbe- fund nach 60 Tagen: Kleines Ödem des lin- k. Labium minus. Das labium minus ist in 2 Lappen quer ge- trennt, nicht empfind- lich; von diesem Riss ist d. Introitusgewebe trichterförmig nach dem unteren Rande des l. horizontalen Scham- beinastes eingezogen, direkt der Sägelinie entsprechend. Von oben her fühlt man eine etwa 1/2 cm breite Knochenlängslinie, das laterale Ende springt über das mediane 1/2 cm über. Der über die Innenseite des Scham- beinastes gleitende Finger fühlt einen feinen Längsspalt, in dem man beim Treten von einem Bein aufs andere eine deutliche Verschiebung der Knochenränder gegen
--	----	--	---	---	----------	---	---	---	---	--	--	---

Spontangeburt.

23. 03/04. Pol. 591 (35)	29	II. p.	c. d. 10 $\frac{1}{2}$ sp. i. 24 cr. i 26 c. et. 18	allg. ver- engtes Becken	I. Schl.	künst- lich	—	—	o. B.	K. 3500	Blasen- sprengung, Impression	Spontangeburt
24. 04/05. Pol. 303 (65)	33	VIII. p.	c. d. 10 $\frac{1}{2}$	mässig ver- engtes Becken	II. Schl., vordere Scheitel- bein- stellung	—	—	Wehen- schwäche	—	Morphium	—	—
25. 04/05. Pol. 340 (69)	34	III. p.	c. d. 10 $\frac{1}{2}$	mässig ver- engtes Becken	II. dorso- post. Querlage, I. Schl., hintere Scheitel- bein- stellung	—	9	—	—	M. 3000, L. 49, Kopfumf. 36, Citemp. 8, Cipariet 9 $\frac{1}{4}$	Äußere Wendung auf den Kopf	Spontangeburt
26. 05/06. Pol. 734 (105)	28	II. p., I. p. spontau, mit 2 $\frac{1}{2}$ Jahr. laufen gelernt	c. d. 11	—	I. Schl.	künst- lich	48	Hängebauch, schlechte Wehen	—	Hochbinden des Bauches; Lagerung auf diel. Seite	—	Spontangeburt
27. 03/04. KI. 197 (141)	22	II. p.	24 27 18 11—11 $\frac{1}{2}$	—	I. Schl.	—	2 $\frac{1}{2}$	—	o. B.	K. G. 2270, L. 49, K. U. 33, Sch. U. 36, Gr. D. 10, Gr. Schr. 13, KI. Schr. 9 $\frac{1}{2}$, Gr. qu. 9, KI. qu. 7 $\frac{1}{2}$	—	Spontangeburt
28. 03/04. KI. 444 (155)	24	VII. p. Rhachitis	24 27 $\frac{1}{2}$ 17 $\frac{1}{2}$ 10 $\frac{1}{2}$	—	II. Schl., hint. Scheitel- bein- stellung	—	21	—	normal	K. 4700, L. 54, K. U. 37, Sch. U. 41, Gr. D. 12, Gr. D. 14 $\frac{1}{2}$, KI. Schr. 10, Gr. qu. 9, KI. qu. 8	—	Spontangeburt

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blas- sprung	Geburts- dauer std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
29. 03/04. Kl. 604 (164)	28	III. p. mit 3 Jahren laufen gelernt, 2× Zange	24 26 18 10 ¹ / ₂ c.v. 8 ³ / ₄ — B.E. 10 ³ / ₄ B.W. 9 ¹ / ₂ B.enge 11 B.A. 9	—	I. Schl.	—	—	—	normal	M. 2720, L. 47, K. U. 37, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10 ¹ / ₂ , Gr. qu. 9, Kl. qu. 7 ¹ / ₂	—	Spontangeburt
30. 03/04. Kl. 484 (166)	23	II. p. mit 3 Jahren laufen gelernt	22 24 17 9 c.v. 9 ¹ / ₂ B.E. 11 ¹ / ₂ B.W. 11 ¹ / ₂ B.enge 11 B.A. 10	Doppeltes Promon- torium, engste Stelle 10 ¹ / ₂	I. Schl.	—	13	—	normal	K. 3190, L. 53, K. U. 34, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13 ¹ / ₂ , Kl. Schr. 11, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt
31. 04/05. Kl. 500 (186)	21	II. p. Vater an Tbc. †	26 29 19 10 ¹ / ₂ —11	—	I. Steiss- lage	—	—	—	normal	M. 2600, L. 49, K. U. 44, Sch. U. 35	Armlösung, Veit-Smellie	—
32. 04/05. (187)	36	VI. p. Rhachitis	26 ¹ / ₂ 27 ¹ / ₂ c.d. 10 ¹ / ₂	—	I. und II. Schl.	—	39	—	am 1. Tage p. p. 38,6", sonst normal	M. und K. 2310, 2800, L. 49, 49, K. U. 34, 34, Sch. U. 32, 36	—	Zwillingengeburt spontan
33. 05/06. Kl. 626 (197)	28	VI. p. Mutter an Tbc. † I. p. Forceps, II.—V. p. spontan	24 27 18 10 ¹ / ₂	—	II. Schl.	—	16	—	o. B.	K. 3730, L. 53, K. U. 38, Sch. U. 39	—	Spontangeburt
34. 06/07. Kl. 772 (217)	26	II. p. seit 6 Jahren Rheumatis- mus	25 27 19 10 ¹ / ₂ c.v. 9-9 ¹ / ₄	—	II. Schl. vord. Scheitel- bein-	—	27	—	o. B.	M. 3700, L. 54, K. U. 33 ¹ / ₂ , Sch. U. 30, Gr. D. 12,5, Gr. Schr. 14,	Walchersche Hängelage	Mitral- insuffizienz, Spontangeburt

36. 06.07. Kl. 676 (219)	22	II. p. spät laufen gelernt	25 27 19 11 c.v. 9 ¹ / ₄ B.E. 10,5 B.M. 11 B.A. 9,5	—	II. Schl.	vor- zeitig	10	—	normal	M. 1870, L. 44. K.U. 30, Sch. U. 29, Gr. D. 10, Gr. Schr. 12, Kl. Schr. 9, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7	—	Spontangeburt
37. 07.08. Kl. 386 (235)	27	II. p.	c.d. 11 ¹ / ₄ c.v. 9 ³ / ₄	—	—	—	—	—	normal	M. 2655, L. 47. K.U. 33, Sch. U. 31, Gr. D. 11, Gr. Schr. 12 ¹ / ₂ , Gr. qu. 8	Dammnaht	Dammriss 1°, Sturzburt
38. 07.08. Kl. 476 (210)	25	III. p. Vater an Lungen- entzündung i. I. p. Steisslage, spontan, II. p. spontan, beide Kinder ausgetragen	25 27 18 11,5 c.v. 9,5 B.E. 10 B.M. 10 B.A. 9,5	—	II. Schl.	—	11	—	normal	K. 3650, L. 52. K.U. 35, Sch. U. 39, Gr. D. 12, Gr. Schr. 13 ¹ / ₂ , Gr. qu. 9	Walchersche Hängelage, Crede	Spontangeburt
39. 07.08. Kl. 579 (281)	25	III. p. Rhachitis, I. p. spontan im 7. Monat, II. p. Zange	25 25 ¹ / ₂ 18 10 ³ / ₄	—	II. Schl.	—	31	F. 37,9°	o. B.	K. 2870, L. 51. K.U. 33,5, Sch. U. 33, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 8,5	—	Spontangeburt
40. 07.08. Kl. 562 (278)	25	II. p. Rhachitis, I. p. spontan	27 28 14,5 c.v. 3 ³ / ₄	Doppeltes Promon- torium	I. Hinter- haupts- lage	—	15	—	gestört, am 7. Tage F. 39,6°, Mastitis	K. 3070, L. 49. K.U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13 ¹ / ₄ , Gr. qu. 9	—	Kyphoskoliose der Brustwirbel- säule, Spontangeburt

C. V. 9,5—8,6.

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
Spontangeburt.												
41. 07/08. Kl. 744 (318)	21	II. p.	24 26 1/2 16 1/2 11,2	—	I. Schl.	—	18	—	ungestört, 37,4 die höchste Temperat.- Steigerung	M. 3260, L. 51, K. U. 34 1/2, Sch. U. 37, Gr. D. 11 1/2, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9	Walchersche Hängelage	Spontangeburt
42. 07/08. Kl. 813 (324)	25	II. p. I. p. spontan	22 25 18 12 c. v. 9 1/2 B. E. 12 B. M. 11 B. A. 9	—	I. Schl.	—	8	—	ungestört	K. 3380, L. 51, K. U. 36, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9,76, Asphyktisch	—	Spontangeburt
43. 07/08. Kl. 863 (325)	27	II. p. I. p. spontan	25 28 19 10 1/2	—	I. Schl.	—	—	—	Riechende Lochien. 38,3 am 5. Tage	M. 3250, L. 53, K. U. 35, Sch. U. 37, Gr. D. 11 1/2, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 8 1/4, Kopf- geschwulst	—	Spontangeburt
44. 07/08. Kl. 887 (326)	21	II. p. I. p. spontan. Mutter an Tbc. †	23 24,5 17,5 11 1/2	—	I. Schl.	—	22	—	ungestört	M. 3600, L. 50, K. U. 36, Sch. U. 38, Gr. D. 12, Gr. Schr. 14, Gr. qu. 10	—	Spontangeburt

Lfd. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
50. 04/05. Kl. 534 (172)	38	IV. p. 2× Perforat. III. p. Hystereuryse, Wendung. Kind †. Blasen- scheidentistel	22 27 17,5 10,5 c. v. 8,4 bis 9 B. E. 11,5 B. euge 10,5	allgem. ver- engtes Becken	I. Schl. mit I. Arm- vorfall	vor- zeitig	—	Beim Wendungs- versuch Uterusrup- tur	—	K. †, 2970 (ohne Gehirn und Schädel- knochen), L. 52, Sch. U. 39	Wendungs- versuch, Perforation, Kranisklasie, Extraktion, Placenta- lösung	† Ablehnung von seiten der Frau die sectio caesarea zu machen. Inkomplette Uterus- ruptur. Nach 2 Std. Tod der Frau. Obduk- tionsbefund: Ruptura incompleta uteri sub- serösus Haematom im Abdomen
51. 03/04. Kl. 145 (148)	43	XII. p. 9 Geburten, 2 Aborte. Kinder †	c. d. 10,5	—	I. dorso. ant. Querlage	—	—	—	ersten 6 Tage Status sub- febrilis	K. †, 3040, L. 49, K. U. 35	Hystereuryse, Wendung, Armösung, Perforation des nachfolgenden Kopfes. Credé. Manuelle Placentallösung	† —
52. 03/04. Kl. 455 (156)	35	IV. p. 2× spontan, III. p. in Narkose. Hoffmeyer- sche Impres- sion. Spontan- geburt. Kind †	24 26 19 10,5 c. d. durch die Bauch- decken gemessen 7 ³ / ₄ , mit Zirkel 9,5, B. W. 11 ¹ / ₄ , B. A. 9 ³ / ₄	—	I. Schl. mit nach I. abgew. Kopf	—	7	Kontrak- tionsring	o. B.	K. †, 3700, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 40. Kopf- geschwulst	Walcher 2×, Hystereuryse, Wendung auf beide Füße, Extraktion Armösung (schwer). Per- foration des nachfolgend. Kopfes. Credé	†
53. 03/04. Kl. 252 (159)	29	II. p. mit 4 Jahren laufen gelernt. I. p. spontan. K. † nach	24,5 25,5 16 10 c. v. 8,5 B. E. 11,5 B. M. 11 ¹ / ₄	—	I. Schl.	—	5	Nabelschnur- vorfall	normal	K. †, 2400 (Sinecerebro), L. 48, Sch. U. 35	Hystereuryse, Perforation, Nabelschnur- Renostions	†

54. 03/04. Pol. 65 (1)	II. p.	c.d. 10,5 c.ext. 17,5	—	I. Stirn- lage	—	15	Meconiumab- gang, Asphyxie des Kindes	o. B.	M. schwer asphyktisch	Wendung, Extraktion	2 Stunden wachen- sche Hängelage, Veit-Smellie
55. 03/04. Pol. 227 (6)	VIII. p. 1. Abort	c.d. 10,5	—	I. Schl.	—	13	Verlangsamung der Herztonie (100), Kon- traktionsring 3 Querfinger breit über der Symphyse	o. B.	K. Diaphysen- fraktur des Armes	Wendung, Extraktion	—
56. 03/04. Pol. 584 (33)	II. p.	c.d. 10,5	—	I. Schl. Vor- derhaupt- u. hintere Schüttel- bein- einstellung	künst- lich	—	Nabelschnur- vorfall	o. B.	M. asphyktisch	Wendung auf beide Füße, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	Scheidendamriss
57. 04/05. Pol. 94 (56)	VI. p. 2× spontan, 3× tot- geboren	c.d. 10,5 sp.i. 25 cr.i. 28 c.ext. 19	—	II. dorso- post. Querlage	künst- lich	—	Nabelschnur- vorfall	o. B.	K. L. 54, K.U. 35, Gr. Schr. 13	Blasenspreng- ung; Ex- traktion, Arm- lösung; Veit-Smellie- Wiegand- Winkel-Martin	Seitl. Scheidenriss
58. 06/07. Pol. 644 (130)	IV. p. 1× Zange, K. †, III. p. Zwillinge, 1 Kind lebt, 1× Perforation	c.d. 10,5	—	I. abgew. Schl.	—	18	Arm- und Nabelschnur- vorfall	—	M. blass asphyktisch, flächlich ober- halb nach 1/2 Std., † nach 10 Stunden	Wendung, Extraktion	† Fraktur der Clavicula
59. 03/04. Kl. 132 (150)	III. p. Skrophulose, 1× Abort, 1× Zange	22,5 24,5 17,5 10,5	—	I. Schl.	—	7 1/2	—	normal	K. 2800, L. 48, K. U. 33,5, Sch. U. 33,5, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 12,5, Kl. Schr. 11, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8 nach 6 Std. †	Hystereuryse, Wendung, Extraktion; Veit-Smellie	—
60. 07/08. Pol. 605 (269)	X. p.	c. v. 9,5	—	II. Hinter- hauptslage, vorä. Schei- telbein- einstellung, Kind †	—	—	—	—	K. †	Wendung, Extraktion; Veit-Smellie	†

Liße. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
61. 07/08. Pol. 875 (311)	32	III. p.) For- I. p.) ceps II. p.)	c. v. 9	—	I. Vorder- haupt- lage	Vorzeitig	—	Gefährdung der mütter- lichen Weichteile, drohende Asphyxie des Kindes	—	M.	Wendung, Extraktion; 2 Spritzen Secacornin, Uterusmassage	—

Äusserliche Wendung.

62. 03/04. Kl. 196 (140)	30	IV. p. 3 > spontan	27 21 19 10 c. v. 8 ³ / ₄ B. M. 11 B. E. 10,5 B. eng 9 ³ / ₄	—	I. dorso- ant. Querlage	—	32	Nabel- schnur- vorfall	—	K. asphyktisch, 3500, L. 49, K. U. 34,5, Sch. U. 34, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 13, h. l. Schr. 10,5, Gr. qu. 9,5, Kl. qu. 8,5	Äusserliche Wendung, Nabelschnur- reposition in Knieellen- bogenlage	—
--------------------------------	----	-----------------------	---	---	-------------------------------	---	----	------------------------------	---	--	---	---

Pubiotomie.

63. 06/07. Gyn. 730 Kl. 704 (284)	33	V. p. mit 4 Jahren laufen ge- lernt, I. p. Zwillinge, Kinder lebensfrisch, II. p. normal, K. später †, III. p. Zange, K. †, IV. p. Steiss- lage K. †	24 27 20 10,5 B. E. 11,5 B. M. 11 B. A. 10 c. v. 8 ⁹ / ₄ -9	Pro- monitorium springt stark vor	I. Steiss- lage	—	22	—	Nach 8 Tagen eine gegen die Scheide abge- grenzte Wund- höhle, die zwischen grossen und kleinen Labium nach der Säge- stelle im Schei- denaste geht und sich, die Sagewunde des Knochens mit umfassend, auch noch ober- halb bis ziem- lich dicht unter	K. 4200, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 39, übertragenes Kind	Walchersche Hängelage, Pubiotomie, Crédé	Retroplacentares Hä- matom, kleiner Schei- denriss, Entlassung nach 4 Wochen, von aussern und von der Vagina aus ein ca. 2 cm breiter Spalt zu fühlen. Von Kallus keine Spur. Beim Auftreten fühlt man von der Vagina aus deutlich eine Ver- schiebung der Enden gegen einander um 1,5 cm nach oben rechts. Unten ohne jede Emp- findlichkeit, auch beim energischen Drücken. Der Einriss links nach
--	----	---	--	--	--------------------	---	----	---	--	--	---	---

64. 07/08. Kl. 90 Gyn. 91 (287)	37	IX. p. Mutter auf Tbc.† I—V. p. Früh- geburten, VI. und VII. p. Nabelschnur- vorfall. K. †, VIII. p. Becken- endlage, K. †	26,5 29 18,5 10,5	Pro- montorium springt stark vor. Die lin- tere Wand d. Symphyse zeigt eine flache, breite Exostose	II. Schl.	—	25	Träge Wehen, Me- conium- haltiges Frucht- wasser	erste 2 Wochen Fieber bis 39°	M. 3320, L. 53, K. U. 35, Sch. U. 34, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9	Pubiotomie, Zange, Credé	Entlassungsbefund nach 4 Wochen ganz völlig frei
65. 07/08. Gyn. 660 (289)	28	II. p., I. p. spontan, Kind † nach 14 Tagen	24 26 18 10 c.v. 8 ⁸ / ₄ B.E. 10,5 B.M. 9,5 B.A. 9	—	I. Schl. hint Schei- tel ein- stellung	—	—	Meconium- haltiges Frucht- wasser	von 4—17 T. bis 39,6°, sonst leichtes Fieber	—	Hebeosto- tonie	Entlassungsbefund nach 45 Tagen Des- census der vord. Vagi- nalwand. Pat. geht ohne Hinken und ohne subjekt. Beschwerden

Sectio caesarea.

66. 04/05. Kl. 660 Gyn. 596 (184)	24	III. p. mit 4 Jahren laufen ge- lernt, Chlo- rose, 2× Forceps, K. †	27 27 17 10,5	Allgemein verengtes Becken	I. Schl.	—	—	—	Nach 3 Wochen entlassen, in den ersten fünf Tagen F. bis 38,8°, dann normal	K. 4180, K. U. 37, Sch. U. 40	Sectio caesarea	Die Rekonvaleszentin wurde in den ersten Tagen nach der Opera- tion durch eine leichte Bronchopneumonie befallen, zu der sich eine Mastitis hinzuge- sellt hatte
67. 06/07. Gyn. 321 (300)	28	III. p. 1× Wendung †, 1× Perforat., 1× Abort, Phthisis pul- monum	c.d. 10,5	—	—	—	—	—	Fieberfrei, Entlassung nach 20 Tagen	—	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus 21 ¹ / ₂ cm Quer- fingerbreit über der Symphyse, leicht ad- härent, Fast kein Fluor

Extraktion bei Beckenendlage.

68. 03/04. * Kl. 225	42	IV. p. Vor 18 Jahren Unfall, wobei Verletzung des Kreuzbeins u. d. Wirbelsäule; 1× Perforat., 2× Frühgeburt	22 25 18,5 11 c.v. 9—9,5 B.E. 9,5 B.M. 9,5 B. enge 8	Doppeltes Promon- torium	I. Voll- kommene Fusslage	—	22	—	normal	M. † 2522, L. 50, K. U. 33, Kind stirbt während der Geburt ab	Hyster- euryse, Extraktion, Weit-Smellie	†
-------------------------	----	--	---	--------------------------------	---------------------------------	---	----	---	--------	--	---	---

Life. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
-----------------------------------	-------	----------	------------------	-----------------	-----------------	-------------------	---------------------------	---------------------	-----------------	------	-------------------------------	-------------

Künstliche Frühgeburt.

69. 04/05. Kl. : 87	23	II. p. Vater an The. v. Mit 2 Jahren laufen gelernt. 1 mal spontan	24 27 19 10-10,5 B. E. 11 B. M. 11,5 B. A. 11,5	—	I. Schl.	—	46	Nabelschnur- vorfall	o. B.	K. j. 2540, I. 46. K. U. 33. Sch. U. 33	Hystereuryse, Wendung auf den Fuss, Extraktion, Perforation d. nachfolgenden Kopfes	Künstliche Früh- geburt
------------------------	----	--	--	---	----------	---	----	-------------------------	-------	--	---	----------------------------

Wendung.

70. 07/03. Pol. 875	32	III. p. I. p. Forceps II. p. "	c. v. 9	—	I. Vorder- haupts- lage	vor- zeitig	—	Gefährdung der mitrleren Weichteile. Drohende Asphyxie des Kindes.	—	M.	Wendung. Extraktion. Spritzen secca cornu, Uterus massage	—
------------------------	----	--------------------------------------	---------	---	-------------------------------	----------------	---	---	---	----	---	---

Vera 8,4—7,5.

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

71. 03/04. Pol. 546	24	I. p.	c. d. 10	—	II. Schl.	—	—	—	o. B.	M. 5000	Impression	Spontangeburt
72. 03/04. Pol. 714	29	I. p.	c. d. 10 sp. i. 24 cr. i. 28 c. est. 20	—	I. Schl.	—	28	Totania uteri	o. B.	—	Morphium	Spontangeburt
73. 05/06.	34	I. p.	c. d. 10	plates	I. Schl.	—	50	—	o. B.	K	Walcheseh	Spontangeburt

74. 03/04. Kl. 135	30	I. p. Mit 2 Jahren laufen gelernt	21 19 10 ^{1/4} c. v. 8	—	—	nach 14 Std. kreissen	—	—	—	Spontangeburt
75. 03/04. Kl. 245	20	I. p. Rhachitis	24 29 19 10 c. v. 8 ^{1/4} B. E. 8,5 B. M. 9 B. A. 8	—	—	T. 37,6	53	normal	K. 3240, L. 51. K. U. 33, Sch. U. 38, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13,5, Kl. Schr. 11, Gr. qu. 8, Kl. qu. 8	Spontangeburt
76. 03/04. Kl. 412	19	I. p. Mit 3 Jahren laufen gelernt	23 25 16 10 ^{1/4} c. v. 8 ^{1/4} B. E. 9 B. W. 10	—	—	—	18	1—7 Tag T. 36,6 bis 38,7	K. 3580, L. 54. K. U. 37,5, Schr. U. 40, Gr. D. 12, Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 8	Spontangeburt
77. 03/04. Kl. 346	22	I. p. Vater an Tbc. †	24 27 19 10	—	—	T. 38,2	47	o. B.	K. 3840, L. 52. K. U. 39, Sch. U. 39, Gr. D. 12,5, Gr. Schr. 14,5, Kl. Schr. 11, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8,5	Spontangeburt: Kind leicht asphykt., bald wiederbelebt. Auf d. linken Scheitel- bein sind zwei etwa bohnengrösse, vom Promontorium herrüh- rende blauverfärbte Druckmarken. Paralyse der rechten Gesichtshälfte
78. 04/05. Kl. 529	22	I. p. Rhachitis	26 27,5 18 10	—	künst- lich	—	21	normal	K. 3320, L. 50. K. U. 34, Sch. U. 37, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 12,5, Kl. Schr. 10,5, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7	Blasen- sprengung Rachitischer Rosenkranz

Lfd. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	in- ter- mitt. Geb. Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
79. 04/05. Kl. 451	23	I. p.	28 32 19.5 10-10.5 c. v. 8 B. E. 9.5. B. M. 10, B. A. 8.5	—	I. Schl.	—	25	—	normal	M. †. 3450. L. 51, K. U. 36. Sch. U. 37. Fazialisparese. Nach 24 Stunden †	—	Spontangeburt. Sektionsbefund des Kindes: Ziemlich grosses subarach- noideales Hämatom
80. 07/08. Kl. 115	35	I. p. Rhachitis	25 31 16 9 c. v. 8	—	I. Schl. Vordere Scheitel- beinein- stellung	—	21	—	normal	M. 2780. L. 51, K. U. 33. Sch. U. 32, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 8.5	Credé	Spontangeburt

Operative Entbindungen.

Zange.

81. 03/04. Pol. 284 Kl. 301	19	I. p. Tbc.	c. d. 10 ¹ / ₄ , sp. i. 24.5, cr. i. 27	—	I. Schl.	—	38	—	10 Tage im Bett gelegen. Erste 7 Tage T. 38,8	K. † Asphyktisch. 3750, L. 50, Gr. Sch. 13.5, K. U. 37, Kl. Schr. 10, Sch. U. 35, Gr. qu. 10, Gr. D. 10.5, Kl. qu. 8	Zange	Kind lebt 1 Tag nur. Sektionsbefund: Punktförmige Blutungen in der medulla oblongata
82. 04/05. Pol. 709	20	I. p.	c. d. 10 pelvis plana	—	I. Schl., dann tiefer Querstand	vor- zeitig	—	Drohende Asphyxie. Schwache Wehen	o. B.	M.	Morphium, Walcher, Forceps, Credé	—
83. 06/07. Pol. 151	25	I. p.	c. d. 9 ³ / ₄ —10	—	II. Schl.	—	32	Schwanken der Herzöne (zw. 100—180).	—	M. † Kopf- geschwulst	Forceps	Dammriss II°

84. 06/07. 34 Pol. 396	I. p. 1 Abort vor 4 Jahren. Seit 4 Jahren ver- heiratet. Mit 4 Jahren laufen gelernt. Eng- lische Krankh.	c. d. 9 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	39	Kontrak- tionsing- 3 cm ober- halb der Symphyse. T. 38, P. 108	7. Tage T. bis 39°. Lochien überreich. Über dem r. Oberlappen der Lunge Schallab- schwächt. Verschärft. Insphium ohne Ge- räusche. Eklampsie, gesund entlassen	K. †. 3750, L. 50, K. U. 37, Sch. U. 35, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 13,5, Gr. qu. 10, Kl. qu. 8. Kopf- geschwulst	Morphium. Scheiden- spülung. Alle 2 Std. heisse Scheiden- spülungen in der medulla oblongata und beginnende Erweichungsherde	Kind asphykt. 11°, wiederbelebt; nach 13 Stunden †. Sektionsbefund: Punktförmige Blutungen in der medulla oblongata und beginnende Erweichungsherde
85. 03/04. Kl. 301	I. p. Vater an Tbc. † Die Kreis- sende ist lungenkrank, mit 1 1/2 Jahr. laufen gelernt	24,5 27 c. d. 10 1/4	—	I. Schl.	—	—	—	—	—	—	—
86. 06/07. Kl. 342	I. p.	25 28 10 10-10,5	—	II. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	28	Drohende Asphyxie des Kindes	normal	K. 3350, L. 52, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 11, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	Walchersche Hängelage. Forceps in Narkose aus Beckenenge	Kind asphyktisch, wiederbelebt. Kopfgeschwulst, rechtsseitige Fazialislähmung

Perforation.

87. 03/04. Pol. 147	I. p. Mit 6 Jahren laufen gelernt	c. d. 9 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	—	—	—	†	Perforation bei totem Kinde	Zeichen von Rhachitis
88. 05/06. Pol. 678	I. p. Mit 4 Jahren laufen gelernt. Rhachitis	c. d. 9,5	—	I. Schl.	—	—	Nabelschnur- vorfall	—	K. † (intrapartum)	Wendung, Extraktion, Ablösung, Perforation am nachfolgen- den Kopfe. Gredé, Naht	Übertragenes Kind. Scheidendamriss

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
89. 06/07. Fol. 750	28	I. p.	c. d. 9,5 - 10	—	I. Schl.	—	—	Nabelschnur- vorfall ohne Pulsation desselben	Fieber- frei	M. †	Perforation, Kranioklasie, Extraktion	—
90. 04/05. Kl. 598	26	I. p., Rhachitis	25 27 17 9,5	—	I. Schl.	—	52	T. 37,5°, P. 80, T. 38,3° nach 20 Stunden	—	K. † 2720 (sine cerebro) L. 51	Perforation, Spontange- burt, Alkohol- spülung	Physometra
Perforation bei lebendem Kinde.												
91. 06/07. Kl. 334	21	I. p., Rhachitis	25 27 18 10—10,5	—	I. Schl.	—	—	Dehnung des unteren Uterin- segmentes	—	K. † 3350 (sine cerebro) L. 54	Walchersche Hängelage, Perforation am lebenden Kinde, Kranioklasie, Extraktion, Crédé	Übertragenes Kind, die Kreissende weist eine Beckenerweiternde Operation zurück. Wegen d. doch immer- hin möglichen Nicht- kehrfreiheit d. inneren Genitalien (d. häufigen inneren Untersuchun- gen) eine Sectio caesa- rea kontraindiziert ist.
Wendung und Extraktion.												
92. 06/07. Fol. 371	30	I. p.	c. d. 10	—	I. dorso- ant. Querlage	—	68	Wechsel der Herztöne	Dammriss gut geheilt	K. asphyktisch	Wendung, Extraktion, Ablösung, Veit-Snellie Dammnaht	Dammriss III°.
Pubiotomie.												
93. 06/07. Kl. 79 Gyn. 282	21	I. p., Rhachitis	24,5—25 16 9 c. v. 7,5—8	—	I. Schl.	—	—	Frucht- wasser- mekonium- haltig	Cystitis, Decubitus, ersten 23 Tage T. bis 39°, dann leichtes Fieber, etwas über	K. † 2800, L. 49, K. U. 35, Sch. U. 34, Gr. D. 10, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 8 (blass asphyk- tisch)	Pubiotomia sinistra, Wendung, Extraktion, Muttermund- inzisionen	Kind nach 1 Tag †. Entlassung nach 62 Tagen, Gang normal, ohne bes. Beschwerden. Mässige Kallus-

links, nicht so weit.
Entlassungsbefund:
Die durchsagte Stelle
ist bei Betastung
schmerzhaft. Von
ausen fühlt man
zwischen den Knochen
eine Verbindungs-
leiste, v. innen dagegen
nicht. Beim Gehen
keine Beschwerden.

Zange,
mediane
Damm-
inzision

beider
Beine,
Hydrops
des rechten
Knies, Ent-
lassung
nach
67 Tagen,
ersten
4 Wochen
T. bis 390

Frucht-
wasser,
Albuminurie

Lungen-
krankheit +.
Rhachitis,
Skrophulose

95. 03/04. 21 Kl. 256	I. p., mit 4 Jahren laufen gelernt	c. d. 10 ¹ / ₄ , c. v. 8,5, sp. i. 24, cr. i. 26,5 e ext. 18,5	—	I. Schl.	—	41	Sehr hoher Damm. Drohende Asphyxie	o. B. Damm- naht gut geheilt	M. 230, L. 50, K. U. 35,5, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13,5, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	Episiotomie, Naht, Durch- schneidung d. Nabelschnur und sofortige Extraktion	Rhachitischer Rosenkranz. Drei- faches Umschlingen der Nabelschnur um den Hals.
--------------------------	---	--	---	----------	---	----	---	---------------------------------------	---	---	---

96. 04/05. Kl. 459 Gyn. 462	28 I. p., Skrophulose, mit 5 Jahren laufen ge- lernt. Vater an Luft- röhrenkrebs +.	25 16	26 9,5	—	I. Schl.	Die Blase ist vor der Opera- tion ge- sprun- gen	—	Thrombo- phlebitis d. l. Beines, Mastitis, Entlassung nach 85 T., in d. ersten 9 Tag. T. bis 39,20. Sonst leicht-Tem- peratur- steigerung. ungünstige Wundheil., 8 Nächte vereitert	M. 3350, L. 51, K. U. 36, Sch. U. 39, + nach 19 Tagen	Seccio caesarea Sterilisation	Kyphoskoliose der Brustwirbelsäule, Lor- dose d. Lendenwirbel- säule, Kind + am 19 Tage p. p. Sektions- befund: Todesursache Sepsis, Odema phleg- monosum pedissin, Intumescencia lienis, gastroenteritis catarr- halis. Nephritis paren- chymatosa, Myocar- ditis, ductus Botalli opertus Intumescencia glandul. mesenter.
97. 06/07. Kl. 808 Gyn. 07/07, 19	27 I. p., Rhachitis	26 17 c. v. 8	28 9,5	—	II. Schl.	—	—	Entlassung nach 49 T. Die ersten 17 Tage Fieber, dann von 23 Tagen 12 Tage	M. 3300, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 12, G. Schr. 13, Kl. Schr. 10,5, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8,5	Seccio caesarea	Linksseitige Skoliose d. Lendenwirbelsäule, Verkrümmung d. Ober- und Unterschenkel, Verdickung des linken Kniegelenkes u. Ver- kürzung des linken Beines um 7 cm

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
98. 07/08. Gyn. 214 Kl. 184	24	I. p., Rhachitis	23 24,5 15 9 ³ / ₄	allgem. gleich- mässig ver- engtes Becken	II. Schl.	—	—	—	Rekonvales- zenz nur durch geringe Tem- peratursteige- rungen ersten 9 Tage gestört	K. 3340	Sectio caesarea	—

Sectio caesarea nach Sellheim.

99. 07/08. Gyn. 782	26	I. p., Mutter an Thc. †, Frucht- wasser seit 8 Tagen abgeflossen	c. v. 8	—	I. Schl., hint. Scheitel- beinein- stellung	vor- zeitig	41	Urin blutig tingiert, Eiweiss schwach positiv, enge straffe Genitalien	Bronchitis diffusa, Bauch- decken- abszess, Riechende Lochien	blass asphyktisch, wiederbelebt	Sectio caesarea nach Sellheim	Mit Rücksicht auf die engen straffen Geni- talien kommt mehr cer- vikaler Kaiserschnitt als Hebesteotomie in Betracht. Entlassungs- befund nach 27 Tagen: Gut verheilte, feste, ca. 1 ¹ / ₂ cm breite Narbe. Uterus in normaler Anteversioflexions- stellung, das corpus hinter der Querschnitt- narbe gut involviert. In d. rechten Seiten noch kleine Infiltration. Lungenbefund: nir- gends Dämpfung, nur noch vereinzelte bron- chitische Geräusche
100. 07/08. Gyn. 815	28	I. p., Rhachitis	c. v. 8,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	—	Cervix- Dehnung	Exitus letalis am 3. Tage †	asphyktisch, wiederbelebt	Sectio caesarea nach Sellheim	Exitus letal. am 3. Tage. Sektionsbefund: Peri- tonitis im vorderen Douglas. Beginnende Abszessbildung einmal zwischen Faszie und Muskel im Bereich der Fasziendrüsen, fer- ner zwischen Muskel u. Peritoneum parietale im Bereich d. Schnitt-

Muttermunde, ist nur
 3 cm lang u. tadellos
 aseptisch verklebt
 Entlassungsbefund
 nach 16 Tagen; Tiefe
 Querschnittnarbe.
 Uterus normal gross,
 anteflektiert, sinistro-
 poniert, sehr beweg-
 lich. Muttermund ge-
 schlossen. Gegend der
 linken Adnexe etwas
 druckempfindlich,
 keine Resistenz da-
 selbst nachweisbar.
 Rechte Adnexe o. B.

I. p., Mutter an Tbc. + Frucht- wasser vor 4 Stunden abgeflossen	e. v. 8,5	—	I. Schl.	—	Sehr bedeutende Cervix- dehnung, Kontraktions- ring fast in Nabelhöhe. Asphyxie des Kindes	Riechende Lochien, Bronchitis, Bauch- decken- abszess	asphyktisch, wiederbelebt	Sectio caesarea nach Sellheim
--	-----------	---	----------	---	--	--	------------------------------	--

Spontangeburt	
Spontangeburt	
Schwangerschafts- zeit: 36. — 37. Woche	
Spontangeburt	
Spontangeburt	

III. p.	c. d. 10, sp. i. 24, cr. i. 28, c. ext. 18.	mässig ver- engtes Becken	II. Schl.	—	—	Tetania uteri, Hängebauch	o. B.	K.	Hoch- binden d Bauches
III. p. I. p. sehr lange, ange- lich 5 Tage	c. d. 10	—	I. Schl.	—	24	—	—	M. Kopf- geschwulst	—
VI p. 2 spont. Kinder leben, 1 × Zange, K. obt. 1 × Wend., K. +, v. p. Früh- geburt, K. lebt 38 Wochen, m. 14 J. laufen gelernt. Vater an Tbc. †.	sp. i. 25 27 18 10 B. E. 11,5 B. enge 7,5 c. v. 9 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	10	—	normal	K. 2650, I. 49. K. U. 34, Sch. U. 35, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10,5, Gr. D. 11, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5	—
IV. p., I. p. normal. II. p. Wendung bei Querlage. III. p. Quer- lage, Spontan- geburt	25 28 18,5 10	—	I. Schl.	—	47	—	o. B.	M. 2600, L. 47. K. U. 34, Sch. U. 34, Gr. D. 11, Gr. Schr. 12,5, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—

102. 03/04. 29	Pol. 688	103. 06/07. 33	104. 03/04. 30	165. 03/04. 25
		Pol. 415	Kl. 265	Kl. 151

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
106. 03/04. Kl. 365	40	IV. p.	27,5 24 17 10 ¹ / ₄	—	I. Schl.	—	12	—	normal	K. 3060, L. 52, K. U. 35, Sch. U. 34, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 13,5, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 7,5	—	Spontangeburt
107. 03/04. Kl. 590	25	II. p. Rhachitis, mit 6 Jahren laufen gelernt. I. p. spontan, aber lang- dauernd	21,5 25,5 15 10 c. v. 8 ¹ / ₄ , B. W. 9 ¹ / ₄ , Benge 10 ¹ / ₄	doppel- tes Pro- mon- torium	I. Schl.	vor- zeitig	13	—	Ent- lassungs- befindl; Adhäre- etwas ver- dickt und empfind- lich	M. 2780, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 37, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10,5, Gr. qu. 8,5, asphyktisch	Walchersche Hängelage	Spontangeburt. Kopf- geschwulst auf beiden Scheitellheilen des Kindes. An der linken Schläfe etwas vor und oberhalb des Ohres eine kleine Emdellung, die Haut darüber ist völlig zerquetscht
108. 01/05. Kl. 492	31	VII. p. 3mal spontan, Kinder leben 1mal Zange, Kind lebt, 1mal Wendung. Kind †. 1mal künstl. Frühgeburt. Kind lebt. Blasenfistel	25 27 18 10	—	I. Schl.	—	10	Nabelschnur- vorfall	normal	M. 2800, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 34	Reposition der Nabel- schnur; Walchersche Hängelage	Spontangeburt
109. 04/05. Kl. 407	32	VI. p. Rhachitis, mit 5 Jahren laufen gelernt. I. p. Zange, Die übrigen Partus spontan. Vor 2 Tagen	25 27 17,5 9,5 c. v. 8 - 8,5, B. E. 10,5 bis 11, B. W. 11,5 bis 12, B. A. 10,5	—	I. Schl.	vor- zeitig	23	—	Von 1. bis 3. Tage p. p. T. bis 38,3°, im übrigen normal, im 4. 5. u. 6. Tage reichende	K. 2860, L. 51, K. U. 34, Sch. U. 36	—	Spontangeburt

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- spannung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
Operative Entbindungen.												
Zange.												
116. 04/05. 22 Pol. 482		II. p. Mit 2 Jahren laufen gelernt	c. d. 10	—	I. Schl.	—	—	Kontraktions- ring oberhalb des Nabels. Sehr grosses Kind. T. der Kreissend. 37,7 ⁰	—	K. 4500, K. U. 37, Sch. U. 40, asphyktisch	Zange, Damm- naht, heisse Uteruskugel ausspülung, Uterusmassage, Cornutin	Starke atonische Nachblutung
117. 05/06 42 Kl. 731		X. p. Spät laufen ge- lernt. Die vier ersten Geburten spontan; darauf Zangengeburt. 1 Abort und Perforationen. 5 Kinder leben.	24 27 17 9 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	44	T. 37,4 ⁰	normal	K. 3130, L. 53, K. U. 37, Sch. U. 36, Gr. D. 12,5, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8, Kopfeschw.	Walchersche Hängelage. Zange.	—
Hohe Zange.												
118. 04/05. 32 Kl. 130		II. p. Mutter a. The. I. p. operativ beendet	26 28 17,5 10 ¹ / ₄	—	II. Schl.	—	30	—	Vom 26. — 28. Tage nach der Ent- bindung T. bis 30 ⁰	K. 3210, L. 53, K. U. 36, Sch. U. 35	Hohe Zange (Tarnier)	Dammriss II ⁰
Perforation.												
119. 04/05. 37 Pol. 524		XI. p. 7 p. u. 3 Aborten mit 3 Jahren laufen gelernt	c. d. 9,5 — 10, Promontorium scharf hervor- springend	—	II. Schl.	—	45	Kon- traktionsring am Nabel	o. B.	K. †	Perforation d. moribunden Kindes. Extraktion	—
120. 03/04. 37 Pol. 377		IV. p. 1× Abort, 1× Per- foration, Scheiden- dammriss II ⁰	c. d. 10	—	I. Schl.	—	12	Mekonium- haltiges Frucht- wasser, Herztöne	o. B.	† L. 56, 3500 (sine cerebro)	Narkose, Wen- dung, Extrakt, Armlösung, Vers. Wiegand, Martin-Winkel, Perforation des	Placenta spontan nach 20 Minuten

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprünge Geburts- Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
Wendung und Extraktion.											
127.03.04 Pol. 756	25	II. p. mit 3 Jahren laufen gelernt.	c.d. 9,5	—	II. dorso- post. Querlage	—	—	o. B.	K. nach 3 Std. †	Wendung, Extraktion, Impression	—
128.04.05 Pol. 327	32	IX. p. 1 Abortus, 7 Partus Rhachitis	c.d. 10	plattes Becken	II. Schl.	—	—	—	K. † nach $\frac{3}{4}$ Std., K.U. 38	Wendung, Extraktion, Veit-Smellie	Hydramnios
129.05.06 Pol. 417	28	III. p.	c.d. 10	—	I. Schl.	—	—	—	K. 4000	Wendung auf beide Füße, Ex- traktion, Crede, Wiegand- Winkel-Martin	—
130.06.07 Pol. 193	30	III. p. I. p. Forceps, II. p. spontan, Kind 8 Monate alt	c.d. 9 $\frac{3}{4}$ bis 10	—	I. dorso- post. Querlage	—	Verlangsamung der Herztonie: Nabelschnurvor- fall, Placenta praevia	o. B.	M. †, asphyktisch nach $\frac{3}{4}$ Std. †	Wendung in Narkose, Extrak- tion, Arni- lösung, Winkel- Wiegand-Martin. Credé	—
131.06.07 Pol. 275	28	IV. p., I. p. Steisslage, K. †, II. u. III. p. nach sehr langer Dauer Zange, beide Kinder kurz nachher †	c.d. 10	—	II. Schl. Hint. Scheitel- beinein- stellung	16	Herztöne wechselnd, Ab- gang von meko- nimhaltigem Fruchtwasser	—	K. leicht asphyktisch	Wendung, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	—
132.06.07 Pol. 409	30	II. p., I. p. vor 2 Jahren Perforation	c.d. 10	—	II. Schl. Hint. Schei- telbein- einstellung	4 T. künstl.	—	—	K.	Wendung, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	—
133.06.07 Kl. 134	25	II. p. Rhachitis, I. p. spontan	20 24 19 9 $\frac{3}{4}$, 10	—	I. Schl. Hint. Scheitel- beinein- stellung	18	Nabelschnur- vorfall	normal	K. 2850, L. 50, K.U. 34 sch. U. 35, Gr.D. 10,5, Gr. Schr. 12,5, Kl. Schr. 10,5	Wendung, Extraktion, Armlösung, Wiegand- Winkel-Martin	—

135. 07/08. Kl. 402	36	II. p. künstl. Frühgeburt, K. †. III. p. künstl. Frühgeb. u. Perf. B.M. 11 IV u. V. p. spont. Frühgeburten	9,5 unt. c.v. 71, r 71/2 B.E. 10 R.M. 11 B.A. 9	26 30 16,5 10 1/4	VI. p. Chlorose, 1× Zange, 2× Fehl- geburten, 2× spontan (Steisslage)	—	—	T. 37,3°	am 10. Tage F. 37,6°, Riechende Lochien	K. 2259, L. 50, K.U. 34, Sch. U. 33, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9	Armiosung, Veit-Smellie, Extraktion, Credé
136. 07/08. Kl. 415	30	IV. p. Rhachitis, Tbc.	25 25 18 10	—	23	—	—	—	am 4. Tage F. 37,8°, sonst o. B.	M. 3250, L. 54, K.U. 34,5, Sch. U. 38, Gr. D. 11, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 9	Wendung in Narkose, Extraktion, Veit-Smellie
137. 04/05. Kl. 432	30	III. p. Rhachitis, als Kind Krämpfe, I. p. spontan, Kind lebte, II. p. künstl. Frühgeburt	23 27 20 10	Symphyse auffallend, hoch, fast 3 Quer- finger breit	—	11	—	—	normal	M. 3180, L. 49, K.U. 34, Sch. U. 36	Hystereuryse, Wendung auf die Füße und Extraktion in Chlorof.-Nark., Winkel-Wie- gand-Martin- Veit-Smellie
138. 07/08 Pol. 814	35	IV. p. I. p. normal, Kind lebt, II. p. Zwillinge, K. †. III. p. Abortus mens V	c.d. 9 3/4 bis 9,5	rhachit. all- gemein ver- engt, plattes Becken, Exo- stose an der Symphyse, spitz vor- spring. Pro- montorium	—	28	—	—	—	K. †, sehr gross, L. 57, G. 4750, K.U. 38 3/4, bleich asphyk- tisch geboren, nach 10 Min. †	Spitzhängebauch Dammriss II°
139. 07/08. Kl. 709	30	Mutter an Tbc. †, Rha- chitis, VII. p., I. und II. p. spontan, Kinder p. p. †, dann 4× Perforation	22 28 16 9,5 c.v. 8,5 B.E. 12 B.M. 11	stark vor- springen- des Promon- torium	5	—	incomplete Uterusrup- tur, Tumor in der den Kopf nicht ins Becken ein- treten lässt	ungestört, be- gin- nende Sym- ptome von Mor- bus Base- dow	M. 1420, L. 40	Wendung, Hoffmeier- sche Im- pression, Credé	Es ist nicht mit Sicher- heit zu sagen, ob der Tumor v. d. Bauchwand od. v. d. Genitalien aus- geht; d. Becken ist der- artig verengt, dass die Durchführung d. Hand grosse Schwierig- keiten macht u. allein schon dadurch d. Wen- dung erschwert wird

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- spannung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
Künstliche Frühgeburt.												
140. 03/04. Kl. 227	28	VI. p. mit 4 Jahren laufen gelernt, Rha- chitis, Skro- phulose, 2× Frühgeburt, 2× spontan, 1× Zange, 4 Kinder †	23 26 17 10 c. v. 8 1/4 B. E. 9 B. W. 12 B. A. 9,5	—	II. Hinter- haupts- lage	— künstl.	14	—	F. 1× 37,8° o. B.	K. †, 2570, L. 48, K. U. 33,5, Sch. U. 34, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 12,5, Kl. Schr. 10,5, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5, K. † nach 24 Std.	künstl. Früh- geburt, Hystereuryse, Reposition d. vorgefallenen Armes, Dammnaht	Frühgeburt in 33. Woche
141. 03/04. Kl. 221	28	II. p. I. p. spontan	24 26,5 17,5 10 1/4 c. v. 8 1/4 B. E. 12 B. M. 12 B. A. 9,5	—	II. Schl.	—	3	—	normal	M. 3160, L. 50,5, K. U. 34, Sch. U. 36, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 9	Hystereuryse	Keine Läsion der Vagina bei d. inneren Messung; Andeutung v. rhachitisch. Rosen- kranz; Spontangeburt
142. 05/06. Kl. 342	38	II. p. spät laufen gelernt, Rhachitis, I. p. Perfo- ration, grav. mens IX	23,5 24 17 10 c. v. 8 1/4	—	II. Schl.	künstl.	—	Hyster- euryuter platzt, Dauerkon- traktionen	normal	K. †, 2280, L. 48, K. U. 31, Sch. U. 31, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 12, Kl. Schr. 9,5, Martin u. Weit- Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 6,5	Hystereuryse, Blasenspreng- ung, Wendung, Ex- traktion bis zum Kopf, Versuch v. Wiegand-Winkel Martin u. Weit- Smellie, Perfo- ration des nach- folgend. Kopfes, Crédé, Scheiden- dammnaht	Künstliche Früh- geburt
143. 06/07. Kl. 271	31	III. p., I. p. Emphytomie, II. p. Fusslage, K. †, Rhachi- tischer Rosenkranz	c. d. 10 cr. i. 24,5 sp. i. 28,5	—	II. dorso- post. Querlage	—	—	Vorfall des linken Armes	normal	K. † 1900, L. 46, K. U. 38, Sch. U. 33, K. 3/4 St. p. p. †	Hystereuryse, Armreposition, Wendung in Narkose, Arm- lösung; Winkel- Wiegand-Martin	—
144. 07/08. Kl. 661	31	VI. p. Rhachit., 4× künstl. Frühgeburt, c. v. 8 3/4 Kinder †, V. n.	24 26 19 10 c. v. 8 3/4 B. E. 11	—	I. Schl.	—	12	—	normal	K. 2680, L. 48, K. U. 32, Sch. U. 33, Gr. D. 10, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 12,5	Hystereuryse	Künstliche Früh- geburt am Ende der 36. Woche

												Stunden †
146. 03/04. Kl. 450	26	III. p. Vater an Tbc. †, mit 2 Jahren laufen gelernt, 1 × Perforat. 1 × Wendung, Kind nach 12 Std. †	c. v. 8 ¹ / ₄ B.E. 11 B.W. 10,5 B.enge 9 ¹ / ₄	doppeltes Promon- torium	I. Schl. dann II. dorso-ant. Querlage; dann II. Steisslage	künstl.	10	drohende Asphyxie	normal	M. 2570, L. 47,5, K.U. 33,5, Sch. U. 34, Gr.D. 10,5, Gr.Schr. 12, Kl.Schr. 10,5, Gr.qu. 9, Kl.qu. 8	Hystereuryse; Wendung, Extraktion, Wiegand- Winkel-Martin	Künstl. Frühgeburt
147. 04/05. Kl. 537	30	VIII. p. Vater an Tbc. †, Rhachitis, alle Kinder †, Rektumfistel	26 18,5 9,5-10 c. v. 8 B.E. 10 B.M. 10,5-11 B.A. 11	—	II. dorso- ant. Querlage	künstl.	14	T. 38 ⁰ , P. 96	am 2. Tage post p., Temp. 38,4 ⁰ , sonst normal	M. † 2960, L. 51, K.U. 33, Sch. U. 36, Gr.D. 11, Gr.Schr. 12, Kl.Schr. 10,5, Gr.qu. 9, Kl.qu. 7	Hystereuryse; Wendung auf den Fuss, Extraktion Veit-Snellie	Künstl. Frühgeburt, Kind nach wenigen Stunden †
148. 04/05. Kl. 692	33	IV. p., I. p. spontan, K. †, II. p. Zange, K. †, III. p. Quer- lage, K. †	27 29 19 101 ¹ / ₄ c. v. 83 ¹ / ₄ B.E. 11,5 B.M. 11,5 B.enge 11 ³ / ₄	—	—	—	—	F. 37,6 ⁰ , P. 96	o. B.	—	Hystereuryse	Künstl. Frühgeburt in der 34. Woche

Extraktion bei Beckenendlage.

150. 06/07. I ^o l. 247	25	IV. p. I. p. Zange, II. p. Querlage Perfor. am nachfolgenden Kopfe, III. p. Frühgeburt	c. d. 9,5	—	II. voll- kommene Fusslage	—	50	Nabelschnur- vorfall, Ver- langsamung der Herztöne	o. B.	M. stark asphyktisch, Impression des linken Schädelbeines, Fraktur der r. Clavicula	Extraktion in Narkose, Armlösung, Winkel-Wie- gand-Martin	Die Impression beim Kinde hat sich nach 8 Tagen zum Teil aus- geglichen; Fraktur gut geheilt
151. 03/04. Kl. 195	28	II. p. spät laufen gelernt, Chlorose; I. p. bei Quer- lage Hyster- euryse; Wen- dung und Extraktion; K. nach 8 Woch. †	24,5 26 17,5 9 ³ / ₄ c. v. 8 ¹ / ₄ B.E. 11 B.enge 10	—	I. Schl. dann II. Querlage, nachher I. voll- kommene Knielage	nach 75 Std	77	—	vom 1. bis 7. Tag T. 38,4°	M. 2940, L. 50, K.U. 35, Sch. U. 33,5, Gr.D. 11, Gr.Schr. 12 ³ / ₄ , Kl.Schr. 10,5, Gr.qu. 10, Kl.qu. 8	Extraktion, Veit-Snellie, Impression	—

Sectio caesarea.

156. 04/05. 31 Kl. 758 Gyn. 17	IV. p. Rhachitis. 2mal Perforation, 1mal Sectio caesarea. Kind lebt	25 28 18 10	—	I. Schl.	—	Am 5. und 8. Tage Temp.-Steigerungen bis 38,2, sonst fieberfrei; nach 18 Tagen Entlassung	K. 3650, L. 55, K. U. 36, Sch. U. 37	Sectio caesarea	—
157. 06/07. 28 Kl. 244	II. p. Rhachitis. I. p. Perforat.	25 27 17 9 ^{1/4} c. v. 7 ^{3/4}	—	I. Schl.	—	Fieberfrei, nach 17 Tagen Entlassung	K. 3650, L. 52, blau asphyktisch M. 2360	Sectio caesarea conservativa Sectio caesarea	—
158. 07/08. 28 Kl. 348 Gyn. 389	III. p. I. p. Perforat. II. p. Kaiserschnitt. K. †	c. d. 9 c. v. 8,5	—	—	—	—	—	—	—
159. 07/08. 38 Kl. 508 Gyn. 585	IV. p. I. p. spont. K. † II. p. spont. K. † III. p. Geschwulst, Perforation, Rhachitis, Skrophulose	26 28,5 16,5 10 c. v. 8, B. E. 10,5 B. M. 10,5 B. A. 9	—	I. Schl.	—	Meconium- abgang. Kopf- geschwulst	M. 3040, L. 30, K. U. 36, Sch. U. 35, Gr. D. 11, Gr. Schr. 13, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8,5	Sectio caesarea	Sehr starke Blutung
160. 03/04. 30 Gyn. 647	III. p. 2mal Perforation	25 26 17,5 10	allgem. verengtes Becken	II. Schl.	—	Tadelloser Verlauf; höchste T. 37,6 (am 5. Tg.) nach 14 T. Fäden- entfernung; Heilung p. p. Am 17. Tage aufgestand.	Kopf- geschwulst	Sectio caesarea conservativa	Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert, etwas nach rechts verlagert, Fundus 4 Querfinger breit über der Symphyse, Adnexe links o. B., rechts nicht getastet
161. 03/04. 30 Gyn. 503	III. p. I. p. Frühgeburt K. †, II. p. Sectio caesarea, K. †. Mit 7 Jahren lauten gelernt. 2mal Lungenentzündung	21,5 26,5 16,5 10,5 c. v. 8 ^{1/4} , 8,5, höchster Querdmesser 10 cm	—	—	—	Wehen- schwäche	L. 53, 3900, K. U. 35	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus gut involviert, anteflektiert, etwas postponiert, Adnexe o. B.

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
162. 04/05. Gyn. 237	26	III. p. 1 mal Forceps k. v. 1 mal Perforation des lebenden Kindes. Mit 3 Jahren laufen gelernt	25 27 17,5 9,5-9 ³ / ₄ B. E. 11,5, B. M. 11,5, B. enge 9,5, c. v. 7 ³ / ₄	—	II. Schl.	—	—	—	Die ersten 11 Tage Temp. bis 38,8. Ent- lassungs- befund nach 29 Tagen: Uterus gut faust- gross ante- flektiert. Aduexe o. B.	M. 3690, L. 54, K. U. 37, Sch. U. 40, asphyktisch	Sectio caesarea	Während d. Operation hat d. Instrumentarius bemerkt, dass ihm noch 3 Lufte und ein Tuch fehlen. Darauf- hin nochmalige gründ- liche Durchsuchung d. Abdomens von seiten des Operateurs ergibt ein negatives Resultat. Zunähen der Wunde. Da aber die Verband- stoffe nirgends zu finden waren, so sieht sich der Operateur ver- anlasst, das Abdomen noch einmal zu öffnen. Es war nichts zu finden. Im Abdomen findet man eine nicht unbe- deutende Menge serö- ser Flüssigkeit blutig tingiert. Ausspülung u. Vernähen der Wunde
163. 06/07. Gyn. 310	33	V. p. 2 mal Perforat. 2 mal Sectio caesarea	25 28 18 10	—	I. Schl.	—	—	—	Fieberfrei, nach 18 Tagen entlassen	G. 3000, lebensfähig	Sectio caesarea	—
164. 04/05. Gyn. 327	28	VIII. p. Rhachitis und Masern. 1 mal Embryo- tomie, 2 mal Perforation, 4 mal künstl. Frühgeburt. 1 mal Abort im 2. Mon. v. 4 Jahr. Familien- anamnese o. B.	27 29 18 10	—	II. Schl.	—	—	—	Wunde p. geheilt, durch Bronchitis gestört; am 14. Tg. wurden die Fäden entfernt	G. 4000, L. 53	Sectio caesarea	Atonische Nach- blutung

163. 06/07. 21 Gyn. 42	I. p. Perforat. Rhachitis; mit 4 Jahren laufen gelernt. Familien- anamnese o. B.	17 c. v. 7		dann gegen Ende des Wochen- bettes leichte Tem.-Steigerung. Am 14. T. Fäden gezogen. Gl. Heilung	Sch. U. 37, Gr. D. 10, Gr. Schr. 9, Kl. Schr. 8, tief asphyktisch †	Uterus ganz auf die rechte Kante gestellt. Infolge perimetrischer Adhasionen am Uterus ist er unbeweglich; deshalb Inzision nicht in der Mittellinie, sondern etwas rechts von der linken Tubencke. Plazenta nicht getroffen, mässiger Blutverlust
166. 06/07. 28 Gyn. 321	III. p. I. p. Wendung II. p. Perforation. Ein Bruder an Phrise †.	c. d. 10,5 c. v. 8,5	Quer verengtes Becken	Am 5. Tage Temp. 38. Sonst Verl. der Rekonvaleszenz einwandfr. Heilung. p. p. Bei d. Entlassung Uterus etw. adhärent	leicht asphyktisch	Section caesarea

C. V. 7,4-6,5.

I Erstgebärende.

Wendung und Extraktion.

167, 06/07, 24 Kl. 206	I. p.	c. d. 9	—	I. Schl.	—	29	Armvorfall. Asphyxie des Kindes	o. B.	M. †, 2400. L. 50. Löffel- förmige Im- pression auf d. r. Scheitelbein 3 markstückgr.	Wendung, Extraktion, Veit-Smellie, Impression	Kind blasse apyretisch geboren, nach 1 Stde. wiederbelebt, nach 5 Stunden gestorben. Sektionsbefund: Todesursache: intra- kranielle Blutung
---------------------------	-------	---------	---	----------	---	----	---------------------------------------	-------	--	--	---

Sectio caesarea.

[illegible]

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- spannung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
169. 07/08. Kl. 578 Gyn. 643	25	I. p., Rhachitis, Chlorose	25 20,5 16 8,5 c. v. 6 ³ / ₄ —7 B. E. 9,5, B. M. 10, B. A. 9	—	II. Schl.	—	—	—	Entlassung nach 16 T., die ersten 2 T. Fieber, T. b. 38,5°. Sonst normal	M. 2500, L. 46, K. U. 33, Sch. U. 34, Gr. D. 10,5, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 8 ³ / ₄ , asphyktisch	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus eleviert, faust- gross. Adnexe o. B. Muttermund geschlossen. Portio zapfenförmig.
170. 03/04. Gyn. 445	20	I. p., Eltern an Schwind- sucht f., Rhachitis	25 27 15 8 ¹ / ₄ —8,5 c. v. 7 ¹ / ₄ —7,5 B. E. 9, B. W. 10, B. enge 10, B. A. 8,5	Doppelpeltes Promon- torium	II. Schl.	—	—	—	normal, Ent- lassung nach 24 Tagen	L. 50, G. 3350	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert, adhaerent an der unteren Bauchwand im unteren Drittel der Narbe
171. 03/04. Gyn. 122	18	I. p.	c. d. 8,5 c. v. 7 ¹ / ₄ B. E. 10,5, B. A. 11,5	—	I. Schl.	—	—	—	Entlassung nach 21 T., ersten 7 Tage T. bis 39°, sonst o. B.	M. 2570, Schwer asphyktisch, Kopf- geschwulst	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus gut zurückge- bildet, anteflektiert, dextrovertiert, Rechte Adnexe o. B., l. etwas verdickt u. empfindlich
172. 05/06. Gyn. 502	27	I. p., Vater an Lungenentzün- dung, Mutter an Unterleibs- leiden f., Rhachitis, Lungenentzün- dung u. Kinder- krankheiten	25 25 14 7,5—7 ³ / ₄ c. v. 6 ³ / ₄ —7	Kyphosco- liose, starke Verkrüm- mung der Oberschen- kel nach aussein und der Unter- schenkel nach innen	II. Schl.	—	—	—	ersten 14 Tage leichtes Fieber, nach 4 Wochen nach Stat. II verlegt	M. 2500, L. 48,5, K. U. 34, Sch. U. 33, Gr. Schr. 12, Gr. D. 10, Gr. qu. 9	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Laparatomienarbe gut geheilt
173. 04/05. Gyn. 454	22	I. p., Rhachitis	25 26 17 8,5	—	II. Schl.	—	—	—	Sehr stark, Odem der Vulva, Schmerzen in beld. Ad- nexengegend. Die ersten	Schwer asphyktisch	Sectio caesarea	—

Wendung und Extraktion.

174. 03/04. 25 Kl. 477	II. p., mit 4 Jahren laufen gelernt, dann englische Krankheit und erst mit 7 J. wieder zu lau- fen begonnen	24 25 18,5 c. d. schätzungs- weise etwas über 9	—	II. Schl. Hint. Scheitel- beinein- stellung	—	8	—	normal	M. + 3860, L. 53, K. U. 36,5, Sch. U. 41, Gr. D. 12, Gr. Schr. 13,5, Kl. Schr. 11, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 7,5	Wendung, Extraktion Winkel- Wiegand- Martin	Übertragenes Kind. Löffelförmige Im- pression des linken Scheitelbeins, Kind stirbt nach 1 Tage. Sektionsbefund: Intracranielles Hae- matom
175. 07/08. 29 Pol. 247	II. p., I. p. Perforation am nachfol- genden Kopfe	c. d. 9	—	I. Schl. Neigung zur hint. Scheitel- beinein- stellung	—	—	—	—	K. asphyktisch	Wendung, Extraktion, Aminlosung, Winkel- Wiegand- Martin	—
176. 07/08. 29 Pol. 558	V. p., I. p. Querlage, Wendung, II. p. Perfora- tion, III. p. spontan, IV. p. Steisslage	c. d. unter 9	Promon- torium sehr weit vor- springend	I. dorso- ant. Querlage	—	künstl.	—	—	K. †, asphyktisch, geboren nach 1 Std. †	Wendung, Extraktion, Aminlosung, Winkel- Wiegand- Martin Veit-Smellie	—
177. 03/04. 25 Pol. 580	IV. p.	26 24,5 15 8,5	Plattes Becken	II. Schl.	—	—	Kontraktions- ring 3 Quer- fingerbreit unterhalb des Nabels	o. B.	M. †, L. 53, K. U. 34	Perforation des lebenden Kindes; Extraktion	—
178. 03/04. 36 Kl. 161 Gyn. 53	II. p., mit 4 Jahren laufen ge- lernt, I. p. Perforation, Rhachitis, Vater an Lungen- krankung †	25 1/4 24,5 16,5 8,5 B. M. 9,5 B. A. 8,5	Doppeltes Promon- torium	I. Schl.	—	—	Anasarca, Urin o. B.	—	K. 4050, L. 52, K. U. 38, Sch. U. 40, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 14, Gr. qu. 11	Sectio caesarea †	Tod der Patientin 6 St. nach der Operation, bei plötzlich eingetretener Blutung a. d. Genitalien. Herzstillstand. Sektions- befund: keine sonderl. anämische Organe, Herz schwimmt im mit Wasser gefüllten Herzbeutel u. entleert beim Eröffnen grosse Mengen Luft aus beiden Venenkeln. (For- ovale persistenz)

Perforation des lebenden Kindes.

Sectio caesarea.

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
179. 05/96. Kl. 235 Gyn. 283	32	III. p. 1 mal Abort, 1 mal Perforat., 1 mal spont. K. +	c. d. 9, c. v. 6 ³ / ₄ , B. E. 11, B. M. 10,5, B. A. 9,5	—	—	—	—	—	Entlassung nach 3 Wochen. T. ind. 6, 7, und 8. Tage bis 39°. Sonst normal.	K. 3260, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 37	Sectio caesarea	Entlassungsbefund: Uterus faustgross, anteflektiert
180. 06/97. Kl. 129 Gyn. 112	21	II. p. I. p. sectio caesarea	24 25 c. d. 8,5, c. v. 7 ¹ / ₄ , B. E. 10,5, B. A. 11,5	—	I. Schl.	—	—	—	vom 6.—15. Tg. Fieber. Temp. bis 38,8°. Entlassung nach 23 Tagen	M. 2700, asphyktisch	Sectio caesarea conservativa	—
181. 07/08. Kl. 320 Gyn. 291	28	II. p. Rhachitis. I. p. Perforation	28 29 19 9,5—10 c. v. 7 ¹ / ₄ , B. E. 10, B. M. 10, B. A. 9	—	II. Schl.	Die Blase ist v. d. Opera- tion ge- sprungen.	—	—	Entlassung nach 25 Tagen, erste 13 Tage fieberhaft. Temp. bis 38,6°	K. 3420, L. 50	Sectio caesarea	—
182. 05/06. Gyn. 462	32	II. p. I. p. v. 7 Jahren, Perforation. Vater an Tbc. +	21 23 15,5 8,5 c. v. 6 ³ / ₄	—	II. Schl. Kopf nach links ab- wichen	—	—	—	ersten 2 Woch. nach d. Operat. T. b. 38,1°, dann normal, Ent- lassung nach 5 Wochen	M. 2870, L. 43, K. U. 36, Sch. U. 37, Gr. D. 11, Gr. Schr. 12	Sectio caesarea conservativa	—
183. 07/08. Kl. 560 Gyn. 639	25	II. p. I. p. Perforat., Rhachitis. Vater an Tbc. +	23 26 17 9	—	—	—	—	—	die ersten 6 Tage Fieber	3250, asphyktisch, L. 48, K. U. 36, Sch. U. 35, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 12,5, Gr. qu. 9,5	Sectio caesarea conservativa	Sehr starke Blutung
184. 04/05. Gyn. 229	27	V. p. 2 mal spontan, 2 mal Perforation,	22,5 29 14 8 ³ / ₄ -9 c. v. 6 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	—	Kontrak- tions- ring in der Nabel- gegend	vom 1.—6. Tag. T. b. 39°, dann leichter Tempe- ratursteige- rungen b. zum	—	Sectio caesarea conservativa	Entlassungsbefund: Uterus gut invol- viert, anteflektiert, Adnexe o. B.

186. 07/08. 31 Gyn. 134	II. p. I. p. Forceps, Totgeburt, Wochenbett- fieber	B. E. 13, B. M. 12, B. enge 10	—	I. Schl.	—	—	geringe Temperatur- schwankungen 2 mal 38,6°	—	—	—	—	Indikation durch die vor 4 Jahren vorge- nommene Fistel- operation.	Symphyse und Nabel unempfindlich. Adnexe o. B.
187. 04/05. 29 Gyn. 366 Kl. 376	II. p. I. p. Hyster- euryse, K. †. Rhachitis	25 27,5 13,5 (ob. Pr. c. d.) unt. Pr. c. v. 7 1/4, 7,5 B. E. 10 3/4, B. W. 11, B. enge 10 1/4	—	II. Schl.	—	—	fast fieberfrei. Temp. zwei- mal bis 38,9° nach 23 Tag. Entlassung	M. 22,0, L. 46, K. U. 35, Sch. U. 34, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 12, Gr. qu. 9	—	—	—	Entlassungsbefund: Uterus anteflektiert, mobil von normaler Grösse, nirgends schmerzhafte Resis- tenz	
188. 04/05. 28 Gyn. 341	III. p. I. p. spontan, II. p. künstl. Frühgeburt. Kind lebte 1 Tg. 1 Abort vor 3 1/2 Jahren im 4. Mon. Masern. Familien- anamnese o. B.	26 29 16,5 9	—	—	—	—	Wochenbett durch 6 Tage lang dauern- den Ikterus gestört. 2 mal Temperatur- steigerungen bis 38 resp. 39° Heilung glatt	asphyktisch	—	—	—	Die Entwicklung des Kopfes ist schwer, da er sich dem Becken- eingang bereits adap- tiert hat. Risswunde im Uterus; Entlas- sungsbefund: Uterus anteflektiert adhärent	

Extraktion bei Beckenendlage.

189. 03/04. 44 Pol. 698	IV. p. spät laufen ge- lernt (7 Jahren), I. p. spontan	c. d. 9 1/4	—	I. Steiss- lage	—	Asphyxie des Kindes	o. B.	M., L. 57. Übertragen	—	—	—	Extraktion, Armlösung, Impression, Veit-Snellie	—
190. 03/04. 26 Kl. 150	III. p. Rhachitis, I. p. spontan, K. †. II. p. Zange, K. †	22,5 23 14 9 c. v. 6 3/4	—	III. Steiss- lage	vor- zeitig	—	o. B.	K. †, (L. 2320, L. 48	—	—	—	Extraktion mit Haken-Impres- sion; Perfora- tion des nach- folgenden Kopfes beim † Kinde; Dammnaht	Scheidendammriss II°. Dammnaht p. s. geheilt

Vera 6,4—5³/₄.

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilf- leistung	Bemerkungen
I. Erstgebärende.												
Zange.												
191. 05/06. KL. 358	26	I. p.	26 27 17,5 8 ³ / ₄	—	I. Schl.	—	4 Tage	Drohende Asphyxie des Kindes	o. B.	K. 2600, L. 18, K. U. 34, Sch. U. 34, Gr. D. 11, Gr. Sch. 12,5, KL. Schr. 9, Gr. qu. 8,5, KL. qu. 7	Walchersche Hängelage, Forceps aus Beckenenge	
Scetio caesarea.												
192. 04/05. KL. 659 Gyn. 642	26	I. p. Graviditas mens. X. Mutter a. Tbc. f. Mit 4 Jahren laufen gelernt. Rachitis	21,5 24 15,5 8-8,5	—	—	—	—	Urticaria, Al- buminurie 1,5 pro Mille Es- sach, mikr. squamitierte Zy- tinder, zahl- reiche Leuko- zyten, platte u. zylindrische Epithelien	Ent- lassung nach 3 Wochen, vom 4. bis 16. Tage T. bis 28,5	M. 2900	Scetio caesarea (nachdem die Er- scheinungen von seiten der Nieren vorüber- gegangen sind)	

II. Mehrgebärende.

Wendung.

193. 06/07. Pol. 491	27	VI. p. 1 ¹ spontan, 3 ⁸ Wendung m. Perforation des nach- folgenden	c. d. 7 ³ / ₄	—	I. Schl.	künst- lich	3 Tage	—	—	K. †	Wendung, Extraktion und Kranioklasie des nachfolgenden Kindes	—
-------------------------	----	---	-------------------------------------	---	----------	----------------	--------	---	---	------	---	---

Enge Becken ohne Angabe der C. v. oder C. d.

I. Erstgebärende.

Spontangeburt.

194. 03/04. 23 Pol. 346	I. p.	—	I. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	—	gut	—	Spontangeburt
195. 04/05. 22 Kl. 746	I. p.	—	I. Schl.	—	25	T. 37,9°	K. 2710, L. 47, K. U. 34, Sch. U. 34	Spontangeburt
196. 06/07. 18 Kl. 658	I. p.	26 21	I. Schl.	—	unbe- kannt	—	K. 2480, L. 49, K. U. 32, Sch. U. 33, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 9, Gr. qu. 8,5, Kl. qu. 8	Spontangeburt
197. 07/08. 23 Kl. 406	I. p. Vater an Lungen- krankheit †	25 17,5	I. Schl.	—	4	—	M. 2770, L. 50, K. U. 34, Sch. U. 34, Gr. D. 11,5, Gr. Schr. 13, Gr. qu. 9	Spontangeburt

Operative Entbindungen.

Zange.

198. 03/04. 29 Pol. 241	I. p.	—	II. Schl.	—	6	gut	K., asphyktisch	Forceps, Dammnaht	Scheidendam- riss
199. 03/04. 20 Pol. 402	I. p.	—	I. Schl.	—	vor- zeitig	o. B.	—	Zange	—
200. 03/04. 31 Pol. 487	I. p.	—	I. Schl.	—	—	Kontraktions- ring zwischen Nabel u. Sym- physe, Kopf- geschwulst	o. B. Damm- naht p. p.	Cervixdehnung, Episiotomie, Zange, Scheiden- dammnaht	—

Idie. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
201. 03/04. Pol. 510	25	I. p.	—	all- gemein ver- engtes Becken	I. Schl.	—	6	Drohende Asphyxie des Kindes	Damm- naht p. p.	M., asphyktisch	Zange, Dammnaht	—
202. 03/04. Pol. 562	23	I. p.	—	—	I. Schl.	—	—	Unregel- mässige Herztöne	o. B.	—	Forceps	—
203. 04/05. Pol. 289	26	I. p. Spät laufen gelernt	—	mässig ver- engtes Becken	I. Schl.	—	—	Asphyxie des Kindes	o. B.	K.	Forceps, Credé, Scheiden- dammnaht	Scheidendamm- riss
204. 05/06 Pol. 448	34	I. p.	E. B.	—	II. Schl.	—	30	Schlechte Herz- töne, Kon- traktionsring, schwache Wehen	—	K.	Forceps aus Beckenenge, Cervixnaht	Cervixriss
205. 05/06. Pol. 731	32	I. p.	—	—	II. Schl.	vor- zeitig	—	—	—	K.	Forceps aus Beckenweite	—
206. 05/06 Pol. 750	26	I. p.	E. B.	—	I. Schl.	vor- zeitig	14	Drohende Asphyxie des Kindes	—	M., Kopf- geschwulst	Forceps im ersten schrägen Durchmesser	—
207. 06/07. Pol. 88	26	I. p.	E. B.	—	II. Schl.	vor- zeitig	—	—	—	K., blau asphyktisch, Kopf- geschwulst	Forceps im gerad. Durchmesser, Scheiden- dammnaht	Scheidendamm- riss
208. 07/08. Pol. 45	20	I. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	50	Asphyxie des Kindes	—	M., bleich asphyktisch, nach 1 Stunde wiederbelebt, Kopf- geschwulst	Forceps, Credé	—
209. 07/08. Pol. 138	27	I. p.	E. B.	—	I. Schl.	künst- lich	—	Drohende Asphyxie des	—	M., asphyktisch	Forceps	Nabelschnur um den Hals des

Pol. 822	I. p.	E. B.	I. Schl.	Kopf im Becken- verengtes Becken	Asphyxie	Kopf- geschwulst	ausgang- Dammnaht	Dammriss
211. 05/06. 28 Pol. 681	I. p.	E. B.	I. Schl.	—	8 Nabelschnur- vorfall	—	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Winkel-wiegand- Martin, Scheiden- dammnaht	Dammriss II ^o
212. 06/07. 30 Pol. 4	I. p.	E. B.	I. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	8 Nabelschnur- vorfall	—	Wendung, Naht	Dammriss II ^o
Perforation.								
213. 05/06. 20 Kl. 646	I. p.	20 22 16,5	II. Schl.	—	48	normal	Perforation ausser- halb der Klinik. Wegen Unmöglich- keit des Anlegens von Kranioklasten in die Klinik ge- schickt. Noch- malige Perforation. Ausspülung des Gehirns, Kranio- klasie, Extraktion, Crédé	Physometra
Perforation des lebenden Kindes.								
214. 05/06. 30 Pol. 486	I. p.	E. B.	I. Schl.	—	48 Nabelschnur- vorfall, Pla- centa praevia atonía uteri	—	Perforation des vorhergehenden Kopfes, Ex- traktion, Créde	—
Extraktion bei Beckenondlage.								
215. 03/04. 32 Pol. 699	I. p.	—	I. Steiss- lage	—	Asphyxie des Kindes	o. B.	Extraktion mit Haken, Dammnaht	Scheiden-damm- riss II ^o
216. 07/98. 26 Pol. 824	I. p.	E. B.	I. Steiss- lage in Becken- mitte	—	36	normal, Damm- naht p. p. geheilt	Wegen vorzeitiger Atmung des Kindes Extraktion, Arm- lösung (schwer), Wiegand-Martin, Rektumnaht	Dammriss III ^o , Impression des rechten Scheitel- beines

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
217. 07/08. Pol. 584	19	I. p.	—	Pelvis angusta rhachitica plana	II. Schl.	—	50	Asphyxie des Kindes	—	K., Kopfge- schwulst, stark asphyktisch, nach 1 1/2 Std. wiederbelebt	Hohe Zange	—
218. 04/05. Gyn. 454	22	I. p., Rhachitis	25 17 26 8,5	—	II. Schl.	—	—	—	Sehr starkes Ödem der Vulva; Schmerz in beid. Adnex- egend., die erst 11 Tage T. bis 39°	Schwer asphyktisch	Sectio caesarea	—

II. Mehrggebärende.

Spontangeburt.

		II. p.	—	—	I. Voll- kommene Fusslage	—	—	Verlang- samung der Herztöne	—	M.	Armlösung; Wiegand-Winkel- Martin	Das Kind wird bis zum Steiss spontan geboren
219. 03/04. Pol. 183	32	II. p.	—	—	—	—	—	—	—	M.	asphyktisch	—
220. 03/04. Pol. 400	43	XIII. p. 1 × spontan, 2 × Perfor., 7 × Wendg., 2 × Abort	—	—	I. Schl. Vord. Scheitel- beinein- stellung	—	—	—	o. B.	M.	Hoffmeiersche Impression	—
221. 03/04. Pol. 418	30	IV. p.	—	allgemein verengtes plattes Becken	II. Schl.	—	—	T. bis 38,5° Bronchitis	—	K.	Morphin; 3 Muttermund- inzisionen	Spontangeburt
222. 03/04. Pol. 441	31	II. p., erstes Kind 5 Pfd., zweit. 4 Pfd.	—	allgemein gleichmäss. verengtes	I. Schl.	—	—	—	af.	K. 3400, L. 37	Morphin; Walchersche	Spontangeburt

Pol. 517	Becken	II. Schl. vord. Scheitel-einstellung	24 29 19	20	schwache	o. B.	M.	Impression, Crédi	Spontangeburt
224. 03/04. Pol. 542	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225. 03/04. Pol. 571	mässig verengtes plattes Becken	I. Schl. hint. Scheitel-einstellung	—	16	Nabelschnur-vorfall, aëctio cordis et pulmonum	o. B.	K. asphyktisch wiederbelebt	Reposition der Nabelschnur in Knieellenbogenlage	—
226. 03/04. Pol. 825	—	I. Schl.	23 25 18	—	tetania uteri; Myoma uteri subserosa	o. B.	M. Druck-marke am I. Scheitelbein	Walchersche Hängelage, Spontangeburt	Scheidendammriss, Spontangeburt
227. 04/05. Pol. 164	—	—	Pelvis angusta	—	—	—	M.	—	Bei Ankunft der Poliklinik ist d. Geburt bereits spontan beendet
228. 04/05. Pol. 219	allgemein verengtes Becken	II. Schl.	—	—	—	o. B.	K.	Leitung der Spontangeburt	—
229. 04/05. Pol. 253	etwas platt verengtes Becken	I. Schl.	—	59	—	o. B.	M. L. 52, G. 4000, K U. 37,5	Walchersche Hängelage, Leitung der Spontangeburt	—
230. 04/05. Pol. 339	mässig verengtes Becken	II. Schl.	—	—	—	o. B.	K.	Dammenschutz	Spontangeburt
231. 05/06. Pol. 93	—	I. Schl.	E. B.	—	—	—	K.	—	Spontangeburt
232. 05/06. Pol. 212	mässig verengtes Becken	I. Schl.	—	—	—	—	K.	Einstellung des Kopfes, Expectatio	Spontangeburt
233. 05/06. Pol. 508	Pelvis angusta	I. Schl.	Pelvis angusta	—	—	—	K.	Crédi	Kind wird während d. Desinfektion der Hände spontan geboren

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
234. 05/06. Pol. 629	38	XI. p.	etwas ver- engtes Becken	—	II. Schl.	—	—	—	—	K.	—	Spontangeburt
235. 05/06. Pol. 642	30	III. p. mit 4 Jahr. laufen gelernt, 1 $\times$ Forceps, 1 $\times$ normal	E. B.	—	I. Schl.	Vorzeit.	60	—	—	M. Kopf- geschwulst, Facialis- lähmung linksseitig	Morphium; Wen- dungsversuch; Lagerung auf die linke Seite, Manu- elle Placentar- lösung; Alkohol- ausspülung	Dammriss I°, Spontangeburt
236. 06/07. Pol. 341	33	IV. p. Die ersten zwei Geburten nor- mal; 3. Geburt durch Zange beendet	E. B.	—	I. Schl.	künstl.	13	—	—	K.	Sprengung der Blase, Einstellen des Kopfes und Impression	Spontangeburt
237. 04/05 Kl. 532	34	II. p. I. p. Nabel- schnurvorfall; Wendung	21 27	—	I. Schl.	—	16	—	normal	M. 3150, L. 51, K. U. 35, Sch. U. 38	Walchersche Hängelage	Spontangeburt
238. 05/06. Kl. 172	30	III. p. Vater an Tbc. †	E. B.	—	I. Schl.	—	—	—	normal	K. 3222, L. 51, K. U. 36, Sch. U. 36, Gr. D. 12, Gr. Schr. 14, Kl. Schr. 10, Gr. qu. 9, Kl. qu. 8	—	Spontangeburt
239. 06/07. Pol. 421	26	II. p., I. p. Per- forat. des nach- folg. Kopfes	E. B.	—	II. Schl.	künstl.	—	—	—	K.	—	Hydramnios, Spontangeburt
240. 07/08. Kl. 563	34	IV. p. mit 2 Jahren laufen gelernt, I. p. Frühgeb., II. p. Sectio	21 26 16,5	—	I. Schl.	—	19	—	o. B.	K. 2400, †	—	Macerierter Fötus, Spontane Ausstossung

Temperatur-
steigerung,
Gr. D. 12,
Gr. Schr. 13,
Gr. qu. 9
Lochien

Zange.

242. 03/04. 30 Pol. 130	III. p. 1× Perforat.	—	I. Schl.	26	Verlangsamung der Herztöne (100)	—	K.	Zange	Frenulumriss
243. 03/04. 33 Pol. 425	II. p.	quer verengtes Becken	—	—	Schwache Herztöne	gut	M.	Zange	—
244. 03/04. 25 Pol. 429	III. p.	E. B.	II. Schl.	—	Drohende Asphyxie des Kindes, Meko- niumabgang	af.	K. Kopf- geschwulst	Forceps, Expressio placentae	Atonische Nach- blutung
245. 03/04. 32 Pol. 548	VII. p.	—	II. Vorder- hauptslage	—	Asphyxie des Kindes, T. 37,7 ⁰	o. B.	K. 2500	Forceps aus Beckenmitte	—
246. 03/04. 29 Pol. 788	II. p. I. p. spontan	—	I. Schl.	24	Asphyxie des Kindes	o. B.	M. Impression des linken Pronto-parie- talbeines	Forceps	Dammriss
247. 04/05. 28 Pol. 91	II. p.	25 26,5 19	I. Schl.	36	Asphyxie des Kindes	o. B.	K. Kopf- geschwulst, G. 4000, K. U. 41, Sch. U. 42	Walchersche Hängelage, Forceps aus Beckenweite, Credé	—
248. 05/06. 36 Pol. 562	II. p.	E. B.	I. Schl.	—	Schlechte Herztöne, Kon- traktionsring	—	K.	Forceps	—
249. 05/06. 32 Pol. 622	VIII. p. 1× Zange, 2× Wendg.	enges Becken	I. Schl.	22	—	—	K.	Forceps aus Beckenausgang	—
250. 05/06. 32	VI. p.	E. B.	II. Schl. vord. Scheitel- bein- einstellung	—	—	—	K.	Forceps aus Beckeneingang	—

259. 03/04 Pol. 503	25	III. p. Partus mens. IX. I. p. Toifgeburt, II. p. Frühgeb.	24 17	26	—	II. dorso-ant. Querlage, Armvorfall	vor- zeitig	44	Nabelschnur- vorfall	o. B.	M., L. 45, K. U. 32	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Impression, Veit-Smellie	—
260. 03/04. Pol. 800	28	V. p. Mit 4 Jahren laufengelernt	—	—	—	I. dorso-ant. Querlage	vor- zeitig	—	Vorfall des rechten Armes u. eingekeilte Schulter	—	K.	Wendung in der Narkose, Arm- lösung, Impression, Veit-Smellie	—
261. 03/04. Pol. 804	—	III. p. 2×Wendung	—	—	—	I. Schl.	—	—	Kontrak- tionsring in d. Nabelhöhe	o. B.	M., L. 45, K. U. 37, (i. 4000	Impressions- versuch in der Narkose, Wendung, Extraktion, Veit-Smellie	Dammriss
262. 04/05. Pol. 6	34	III. p.	—	—	—	I. Schl. Vordere Scheitel- bein- stellung	—	—	Nabelschnur- vorfall	o. B.	K.	Reposition der Nabelschnur in Narkose, Ein- stellung d. Kopfes über das Becken, Walchersche Hängelage, Hyster- euryse, Wendung, Extraktion, Veit-Smellie	—
263. 04/05. Pol. 182	37	X. p.	—	—	—	II. dorso-ant. Querlage	—	22	—	o. B.	K. f., nach 1½ Std. läßliche Im- pression des Inlinken Scheitel- beines	Wendung, Extraktion, Wiegand- Winkel-Martin	—
264. 04/05. Pol. 313	29	V. p.	—	—	—	I. Schl. all- gemein ver- engtes Becken	künst- lich	—	—	o. B.	M.	Walchersche Hängelage, Wen- dung, Extraktion, Wiegand-Winkel- Martin	—
265. 04/05. Pol. 450	32	IV. p. I. p. Wendung, 1×Perforation	—	—	—	II. Schl. mässig ver- engtes Becken	—	—	Nabelschnur- vorfall des Asphyxie des Kindes, Meko- niumabgang	o. B. T. b. 37,2°	M 4000, K. U. 37,5, Sch. U. 38	Wendung, Extraktion, Wiegand-Martin- Winkel, Dammnaht	Dammriss II°

Lfd. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
266. 04/05. Pol. 548	34	III. p.	—	—	II. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	—	—	—	K.	Wendung auf die Füsse, Extrak- tion, Armlösung, Veit-Smellie	—
267. 05/06 Pol. 161	28	IV. p.	Pelvis angusta	—	I. Schl.	—	—	Nabelschuur- vorfall, Asphyxie des Kindes	—	K., asphyktisch, nach $\frac{3}{4}$ Std. wiederbelebt	Wendung, Extrak- tion, Dammaht, Veit-Smellie, Wiegand-Winkel- Martin	Fractura numeri dextr., Dammriss
268. 05/06 Pol. 285	32	III. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	72	—	—	M.	Wendung, Extraktion	—
269. 05/06. Pol. 509	36 $\frac{2}{2} \times$ spontan, $\frac{2}{2} \times$ Perforation	IX. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	—	Drohende Asphyxie	—	K.	Wendung, Extraktion	—
270. 05/06. Pol. 639	41 $2 \times$ normale Geburten	IX. p.	E. B.	—	II. Schl.	—	—	Nabelschuur- vorfall, drohende Asphyxie	—	K., asphyktisch, nach $\frac{3}{4}$ Std. wiederbelebt, n. $2\frac{1}{2}$ Std. $\dagger$	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Veit-Smellie	Obduktionsbefund des Kindes ergibt freies Blut in der Bauchhöhle, zahl- reiche Ecchy- mosen der serösen Häute, Blutungen in der Lunge
271. 05/06. Pol. 674	30 V. p. $4 \times$ Zange	V. p.	E. B.	—	I. dorso-ant. Querlage	künst- lich	—	—	—	K. $\dagger$	Wendung, Veit-Smellie	—
272. 06/07. Pol. 339	24 II. p. I. p. sehr langdauernd	II. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	31	Verlang- samung der Herztöne	—	M.	Wendung, Arm- Extraktion, Arm- lösung, Veit- Smellie. Naht eines linksseitig Cervixrisses, Scheidenspülung	Linksseitiger Cervixriss

		dauernd. Lues hereditaria	lage									Wendung auf die Füsse, Extraktion	
274. 06/07. Pol. 649	35	II. p. 3× spontan, 5× Kunst- hilfe	—	E. B.	—	I. Schl. Steigung z. hinteren Scheitel- beinein- stellung	künst- lich	—	—	—	K.	Wendung, Extraktion	—
275. 07/08. Pol. 33	30	V. p. 1× Forceps, 3× Wendung, 1 Kind lebt	—	E. B.	—	I. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	—	o. B.	K.	Wendung in Narkose, Extrak- tion, Armlösung, Wiegand-Winkel- Martin	—	—
276. 07/08. Pol. 34	33	VI. p. Nur 1 Kind lebt Sämtl. Unter- endlagen und Wendungen	—	E. B.	—	I. Schl. Schief- lage	—	26	o. B.	K., asphyktisch	Wendung in Narkose, Extrak- tion, Armlösung, Veit-Smellie, Credé	Wendung auf den Fuss, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	Atonia uteri
277. 07/08. Pol. 109	28	VII. p. I. p. Zange, II. - VII. p. Wendung	—	E. B.	—	II. Schl.	künst- lich	—	—	M.	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Veit-Smellie	—	—
278. 07/08. Pol. 118	32	III. p.	—	E. B.	—	II. Schl.	—	16	Drohende Asphyxie des Kindes	M.	Wendung, Extrak- tion, Armlösung, Veit-Smellie	—	—
279. 07/08. Pol. 216	28	VI. p.	—	E. B.	—	II. Schl. Hintere Scheitel- beinein- stellung	—	—	—	K., leicht asphyktisch	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Veit-Smellie	—	—
280. 07/08. Pol. 215	32	VIII. p. 4× Perforat., 1× Wendung	—	E. B.	—	I. Schl.	—	—	Nabelschnur- und Armvorfall	K., leicht asphyktisch	Wendung auf den Fuss, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	Fraktur des linken Armes, Infraction des linken Ober- schenkel-	des linken Ober- schenkel-
281. 07/08. Pol. 249	30	VI. p.	—	E. B.	—	II. Schl.	—	65	Drohende Asphyxie des Kindes	M., Kopf- geschwulst	Wendung auf beide Füße, Extraktion, Arm- lösung, Veit-Smellie	—	—

Frde. No. Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer St	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
282. 07/08. Pol. 284	36	III. p. Wen- dung. II. p. Tot- geburt	E. B.	—	I. Schl.	künst- lich	—	—	—	M.	Wendung, Extraktion, Arm- lösung, Veit- Smellie, Credé misslingt, daher Credé in Narkose	Atonia gravissima. Das Blut schießt in fingerdicken Strahle. Massage. 3 Spritz. Cornutin. 2 Pillen Cornutin. Heisse Alkoholi- spülung. Kein Cervixriss
283. 07/08. Pol. 377	33	IV. p. p. 1) Forceps, 2) Perforation	E. B.	—	II. Schl.	—	14	Drohende Asphyxie	—	M., asphyktisch	Wendung, Extrak- tion, Armlösung, Veit-Smellie	—
284. 07/08. Pol. 386	30	V. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	25	Drohende Asphyxie	—	M., leicht asphyktisch	Wendung, Extraktion, Veit-Smellie	Massige Atonie des Uterus
285. 07/08. Pol. 415	30	VI. p.	E. B.	—	II. Schl.	—	48	—	—	K.	Wendung, Extrak- tion, Armlösung, Veit-Smellie, Credé, Cornutin, Massage	Atonia uteri
286. 07/08. Pol. 492	28	VI. p. 1 < Per- foration, 4 < spontane	E. B.	stark vor- springen- des Promon- torium	II. Schl.	—	—	Nabelschnur- vorfall	—	K. †	Wendung, Extrak- tion, Armlösung, Winkel-Wiegand- Martin, Veit- Smellie, Cornutin, Eisblase, 2 Spritz. Kampher	Collaps der Frau bei Chloroform- narkose
287. 07/08. Pol. 506	39	X. p.	E. B.	nach rechts vorspring. Promon- torium	I. Schl.	künst- lich	—	Nabelschnur- vorfall	—	M.	Wendung in Nar- kose, Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	—
288. 07/08. Pol. 528	26	III. p. II. p. Quer- lage, Wendung	E. B.	—	I. Schl.	—	—	Vorfall des linken Armes. Drohende Asphyxie	—	M.	Repositionsver- such, Wendung in Narkose, Extrak- tion, Armlösung, Winkel-Wiegand	Habitus rhachi- ticus

290. 07/08. Pol. 641	23	II. p.	—	Pelvis angusta plana, rhythifica	II. Gesichtslage	—	7	Vorfall des rechten Armes u. Nabelschnur. Asphyxie des Kindes	—	K.	Repositionsversuch, Wendung, Armlösung, Wiegand-Martin-Winkel, Veit-Smellie	Extraktion, Armlösung, Veit-Smellie	—
291. 07/08. Pol. 647	21	II. p.	E. B.	—	I. dorso-ant. Querlage	—	—	Nabelschnur- u. Armvorfall. Asphyxie des Kindes	—	K. †, asphyktisch geboren, nach 1 Stunde †	Wendung, Extraktion, Wiegand-Martin-Winkel u. Veit-Smellie in Walcherscher Hängelage	Atonia uteri	
292. 07/08. Pol. 657	35	X. p., darunter ein Abort	E. B.	—	II. Hint. Scheitelbeinhinstellung	—	48	Asphyxie des Kindes	—	K. †	Wendung, Extraktion, Credé	Kind schwer asphyktisch, kann nicht zum Atmen gebracht werden	
293. 07/08. Pol. 713	31	II. p. Perforation des toten Kindes an vorangehenden Kopfe. Puerperalfieber. 3/4 Jahre in der Klinik gelegen	—	allgemein verengtes plattes Becken. Promontorium stark vorspringend, beide Suberachischii sehr aneinander genähert	II. Schl. vorzeitig	—	—	Asphyxie des Kindes. Mekoniumhaltiges Fruchtwasser	nach 6 Tagen ist die Wöchnerin wegen Fieber in die Klinik transportiert	K. †, bleich asphyktisch geboren, kann trotz aller Belebungsversuche nicht zum Leben gebracht werden	Wendung in Narkose. Extraktion, Armlösung, Winkel-Wiegand-Martin, Veit-Smellie, Dammnaht	Dammriss II°. Hysterische Anfälle. Ruf wegen Eklampsieverdacht. Uterus bicornis oder Adnex-tumor	

57

Perforation.

294. 03/04. Pol. 403	38	IV. p. I. und II. p. normal, III. p. langdauernd	—	—	I. Schl. II. Scheitel- beinhel- stellung	—	—	Kontrak- tionsring	gut	†, Kopf- geschwulst	Zangenversuch. Perforation, Extraktion	—
295. 03/04. Pol. 538	33	X. p. 3 Aborte	—	—	II. Schl.	—	—	—	o. B.	† Übertragen, 4680 ohne Gehirn, L. 51, K. U. 39	Wendung auf den vorderen Fuss. Extraktion. Armlösung. Per- foration des nach- folgenden Kopfes. Dammnaht	—

Lide. No. Jahrgang. Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung	Geburts- dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfe- leistung	Bemerkungen
296. 04/05. Pol. 72	24	III. p.	c. ext. 17	—	II. Schl.	—	—	—	o. B.	K. †, maceriert	Perforation, Kranioklastie, Extraktion	—
297. 04/05. Pol. 82	26	IV. p. 2 > Perforat.	sp. i. 21 cr. i. 23 c. ext. 16,5	—	II. Schl.	—	—	Tetania uteri	o. B.	K. †	Wendung, Extraktion, Perforation des nachfolgenden Kopfes	Scheidendam- riss II°
298. 03/04. Pol. 823	37	XI. p.	24 17	—	II. dorso- ant. Querlage	—	—	—	o. B.	K. †, K. U. 33 (sine cerebro)	Wendung in Nar- kose. Extraktion. Schwere Armlosg. Impressionsver- suche. Perforation des nachfolgenden Kopfes	—
299. 04/05. Pol. 239	28	III. p.	Pelvis angusta	—	I. Schl.	—	—	Nabelschnur- vorfall	o. B.	K. † (Übertragen) G. 4500 (sine cerebro)	Perforation des vorangehenden Kopfes. Kranio- klastieversus, dabei Cervixriss, deshalb Wendung. Extraktion, Crédé. Cervixnaht	—
300. 04/05. Pol. 271	24	II. p.	Pelvis angusta	—	I. Schl. Hintere Scheitelf- beinein- stellung	künst- lich	54	Kontraktions- ring bandbreit über der Symphyse. Temp. 38,2°	normal	K. †, G. 3500 (sine cerebro) L. 53	Wendungs- versuch. Perforation. Crédé	—
301. 05/06. Pol. 271	26	V. p. 4 schwere P. Kinder alle †	Pelvis angusta	—	II. dorso- ant. Querlage	künst- lich	—	Armvorfall	—	K. †	Wendung, Perforation des nachfolgenden Kopfes	—
302. 05/06. Pol. 576	24	VII. p. Mit 2 Jahren laufen gelernt. Lange Dauer d. Geb. Geburten	E. B.	—	I. Schl. Hintere Scheitelf- beinein- stellung	—	50	—	—	K. †, 4100 (sine cerebro) K. U. 39, I. 56	Wendung, Per- foration des nachfolgenden Kopfes	—

304. 05/06. Pol. 739	39	XI. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	—	Hängebauch. Drohende Asphyxie	—	K. † Übertragen	Wendung, Extraktion, Perforation des nachfolgenden Kopfes	Perforation des nachfolgenden Kopfes
305. 06/07. Pol. 278	31	III. p.	E. B.	—	II. Schl.	—	—	Nabelschnurvorfall, Infaust	—	K. †, G. 2800 (sine cerebro)	Perforation, Kranioelastie	—
306. 06/07. Pol. 296	33	IV. p. Rhachitis. I. p. langdauernd, spont. II. p. Querlage. K. † vor 10 J. Scheid.-Dammriss, daran Scheidenmastdarmpfistel. III. p. K. †	E. B.	—	II. dorso-ant. Querlage	—	—	—	—	K. †	Wendung auf den oberen Fuss. Extraktion, Armlösung, Perforation, Impression, Veit-Smellie	—
307. 06/07. Pol. 454	28	III. p. I. p. sehr langdauernd, spont. Kind † II. p. Steislage, Perforation. Zeichen von Rhachitis	E. B.	—	I. Schl.	—	28	Mekoniumabgang. Dauerkontraktionen. Kontraktionsring handbreit unter dem Nabel	—	K. †, G. 3500 (sine cerebro)	Wendung auf d. Fuss. Extraktion, Armlösung, Perforation des nachfolgenden Kopfes	—
308. 06/07. Pol. 873	34	III. p.	E. B.	—	II. dorso-ant. Querlage	—	—	—	feberfrei	K. †, (†. 4000 (sine cerebro)	Wendung, Extraktion, Armlösung. Perforation des nachfolgenden Kopfes. Manuelle Placentallösung. Alkoholspülung	—
309. 04/95. Pol. 95	40	V. p. Die ersten 4 Partus spontan	E. B.	—	II. Schl.	—	50	—	—	M. †	Hohe Zange, vergebli. Wendung, Extraktion, Armlösung, Perforation des nachfolgenden Kopfes	—

Life. No., Jahrgang, Journal	Alter	Anamnese	Becken- masse	Becken- form	Kindes- lage	Blasen- sprung dauer Std.	Kompli- kationen	Wochen- bett	Kind	Art der Hilfeleistung	Be- merkungen
310. 07. 08 Pol. 301	43	III. p.	E. B.	—	I. Schl.	—	Asphyxie des Kindes	—	K. †	Wendung; Exstruktion, Armlösung; Veit- Smellie, Perforation d. nachfolgend. Kopfes des abgestorben. Fötus	—
311. 07. 08 Pol. 587	41	II. p. I. p. vor 16 Jahren an- geblich 4 Tage spontan. K. 1894	—	stark vor- springen- des Pro- montorium	I. dorso- post. Querlage	— 39	—	—	K. †, 4500 L. 60	Wendung; Exstruktion, Perforation des nach- folgenden Kopfes	—
312. 07. 08 Pol. 650	26	III. p. I. p. Perfor., II. p. Wendg.	—	plattes Becken	I. Schl.	—	T. 38,2%, Asphyxie des Kindes	—	K. †, Kopf- geschwulst	Wendungsversuch, Perforation des † Kindes, Crédié	—
313. 03. 04 Pol. 625	37	X. p.	—	mässig verengtes Becken	II. Schl. vord. Schei- telbein- einstellung	vorzeitl. Vorzeitl.	Nabelschnur- vorfall, Kontraktions- ring, Vulva cordis	o. B.	K. †	Nabelschnurposition in Knieellenbogenlage, Perforat. des lebend. Kindes; Exstruktion; Crédié	—
314. 04. 05 Pol. 443	36	XII. p. 1 × spontan, 1 × Zange, 1 × Frühgeb., 1 × Perforat.	—	—	I. Schl. vord. Scheitel- beinein- stellung	—	Kontrak- tionsring zwischen Nabel und Symphyse	o. B.	M. †	Hofmeisterscher Impressionsversuch; Hoherzangenversuch, Perforation des noch lebenden Kindes; Kranioklasie	—
315. 07. 08 Pol. 717	38	III. p. I. p. Frühgeb., II. p. Stirn- lage, Perfor.	—	sehr enges Becken	I. Schl. Kopf be- weglich über dem Becken- eingang	—	Übertragenes Kind, Nabel- schnurvorfall, Mekoniumab- gang, Asphyxie des Kindes	—	M. †, 4250 L. 59	Wendung; Extrakt. Wendg. des nach- folgenden Kopfes; Dauerkatheter	Blutiger Urin

Exstruktion bei Beckenendlage.

316. 04. 05 Pol. 453	36	VII. p. + 1 Abort	mässig verengtes	—	II. voll- kommene	—	Asphyxie des Kindes	—	M.	Exstruktion mit Haken	Fractura fo- moris sinistrae im oberen
-------------------------	----	----------------------	---------------------	---	----------------------	---	------------------------	---	----	--------------------------	--

318. 07/08. 39 Pol. 635	VIII. p. 2 × ärztliche Hilfe	—	I. dorso- ant. Querlage	—	—	tiefer Sitz der Placenta T. 37,5°	—	K. leicht asphyktisch	Hystereuryse; Wen- dung, Extraktion; Wiegand-Winkel- Martin; Veit-Smellie	—	Drass asphyktisch geboren	schmutz in Knieellen- bogenlage, nach 2 Std. Reposition in Narkose, Armlösung, Veit-Smellie
Künstliche Frühgeburt.												
319. 07/08. 30 Gyn. 157 Kl. 110	V. p. Rhachitis, 1 × Abort, 2 × Zange, 1 × Kaiser- schnitt	—	II. dorso- ant. Schräg- lage sehr weit nach vorn	das Prä- mon- torium springt nach vorn	—	—	erste 2 Wochen Fieber; Ent- lassung nach 3 Wochen	K. 1550, L. 42. K. U. 20, Sch. I. 24, Gr. D. 9 ¹ / ₂ , Gr. Sch. 10 ¹ / ₂ , Gr. qu. 8, asphyktisch wiederbelebt, Exitus	Sectio caesarea, Sterilisation	Das Kind zeigt typische De- flexionsstellg., das Hinter- haupt ganz nach gedrückt		
Sectio caesarea.												
320. 07/08. 24 Pol. 727	V. p. Letzter Partus durch Forceps, vorletzter P. Frühgeburt	—	II. Schl.	pelvis plana	Hohe Zange.	20 Nabelschnur- vorfall, Asphyxie des Kindes	—	K. †, asphyktisch geboren, nach 1/4 Std. †	Wendungsversuch, Hohe atypische Zange, Credé	—		
321. 07/08. 34 Pol. 822	VI. p. I. und II. p spontan, III. p. Zwillinge	—	I. Schl.	allgemein verengtes Becken	Asphyxie des Kindes, Kopf- geschwulst; Prolapsus vaginae anterior et posterior	—	—	K. am linken Stirnbau- rinnen- förmige Impression	Hohe Zange zuerst im queren Durch- messer, dann im II. schrägen Durch- messer	Eintritt des Kopfes unter leichtem Zug		
322. 07/08. 24 Pol. 912	III. p. 2 × spontan	E. B.	I. vord. Scheitel- bein- stellung	stark vor- springen- des Promon- torium	51	Asphyxie des Kindes	—	K. Zweimark- stückgrosse, tiefe Im- pression des link. Scheitel- beines; sehr grosses Kind	Hohe Zange	leicht aus- geführt		

Nach der Beschreibung dieser schematischen Tabelle werde ich mich bemühen, etwaige Schlüsse daraus zu bekommen.

Vera 9,5—8,5 (71).

I. Erstgebärende (23).

Von den 23 Erstgebärenden kamen 15 spontan mit lebendem Kinde nieder.

Operative Entbindungen (8).

Zange: mit Zange wurden 5 entbunden; davon wegen Gefahr von seiten des Kindes 2.

Perforation: 1mal.

Pubiotomie: 1mal.

Muttermundinzisionen: 1mal.

Eins der Kinder ist tot zur Welt gekommen.

Wochenbettsverlauf.

Bei den 15 spontan gebärenden Frauen verliefen die Wochenbette normal, von den operativ beendeten Geburten sind 5 Wochenbetten gestört gewesen, eine Wöchnerin ist krank gewesen.

Überblick: Von den 23 Erstgebärenden mit c.v. 9,5 bis 8,5 starb keine. Die Kinder sind, mit Ausnahme des Perforierten, alle lebensfähig geboren, 5 Wochenbetten sind gestört gewesen, eine Wöchnerin ist erkrankt.

II. Mehrgebärende (48).

Von den 48 Mehrgebärenden kamen 22 spontan nieder; 26 wurden operativ entbunden. Von den spontan geborenen Kindern waren sämtliche lebensfähig.

17 Wochenbetten verliefen normal, eins gestört und eine Wöchnerin war an Mastitis erkrankt.

Operative Entbindungen (26).

Zange: 3mal. Ein Kind tot. Sektionsbefund: Intrakranielle Blutung; sämtliche Zangenoperationen sind aus Indikation von seiten des Kindes (Asphyxie) ausgeführt worden. 1mal wurde die Zange in Beckenmitte angelegt.

Wendung: 8mal wurde die Wendung und Extraktion gemacht, und zwar 3mal wegen Nabelschnurvorfalls; 2mal ist die Wendung wegen Asphyxie des Kindes ausgeführt worden. In 2 Fällen sind die Kinder nach wenigen Stunden gestorben; 1mal ist ein Arm frakturiert worden.

Perforation (7): 1mal wurde die Perforation ausgeführt wegen Uterusruptur beim Wendungsversuch, 1mal wegen drohender Ruptur des Uterus. Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 3000 g.

Äusserliche Wendung (1): Kind asphyktisch geboren. Geburtsdauer betrug 32 Stunden.

Pubiotomie (3): Entlassung durchschnittlich nach 5 Wochen. Wochenbetten krank. In einem Fall bei der Entlassung keine Kallusbildung; Gang etwas hinkend. In den übrigen Fällen Gang völlig normal.

Sectio caesarea (3): In 2 Fällen Wochenbett krank. Entlassung in 3 Fällen nach 3 Wochen.

Extraktion bei Beckenendlage (1): Hystereuryse, Extraktion. Kind stirbt während der Geburt ab.

Resümee: Von den 48 Kreissenden starb keine. Von den Kindern starben 12: bei Zangenentbindung 2, perforiert wurden 7, bei Wendung 2, bei Extraktion bei Beckenendlage 1. Von den totgeborenen Kindern fallen 2 der Therapie zur Last (intra partum abgestorben). 5 Wöchnerinnen fieberten.

Vera 8,4—7,5 (95).

I. Erstgebärende (31).

Spontangeburt (10): Von 84 Frauen mit Verengerung des Beckens von c. v. = 8,4—7,5 sind 31 Erstgebärende gewesen, von denen spontan mit lebendem Kind 9 niedergekommen sind. Ein Kind starb nach 24 Stunden. Kompliziert war ein Fall durch Tetanie des Uterus.

Wochenbetten: 1mal status febrilis. Von den Müttern ist keine gestorben.

Operative Entbindungen (21).

Zange (6): Indikationen von seiten des Kindes 3mal; von seiten der Mutter auch 3mal.

Von den Kindern sind gleich 2 gestorben; 2 nach einigen Stunden; die Sektionsbefunde bei den beiden letzten haben punktförmige Blutungen in der medulla oblongata ergeben. Wochenbettsverlauf: 2mal gestört. Bei einer Wöchnerin-Eklampsie. (Fall 76.)

Perforation des toten Kindes (1): Wochenbett normal.

Perforation (4): 1mal wegen Dehnung des oberen Cervixsegmentes. Wochenbetten normal.

Wendung (1): Indikation von seiten des Kindes.

Pubiotomie (2): Komplikation bei Geburt: Asphyxie des Kindes. Ein Kind nach dem ersten Tage gestorben. Wochenbetten in beiden Fällen gestört. Entlassung im ersten Falle nach 8, im zweiten Falle nach 9 Wochen. Gang ungestört, ohne Beschwerden; mässige Kallusbildung.

Episiotomie (1): Indikation: Drohende Asphyxie.

Sectio caesarea (3): Alle Kinder lebend entlassen, ein Kind nach 10 Tagen gestorben.

Sectio caesarea extraperitonealis nach Sellheim (3): Wochenbetten krank. Eine Frau ist gestorben. (Fall 100).

Resümee: Von den 31 Kreissenden ist eine gestorben; 5 Kinder kamen tot zur Welt: bei Spontangeburt 1, bei Zange 3, ein Kind ist perforiert worden, nachdem es schon abgestorben war; 9 Wochenbetten sind gestört gewesen.

II. Mehrgebärende (64).

Von den 64 Kreissenden kamen 15 spontan nieder; 46 wurden operativ entbunden.

Von den spontan geborenen Kindern ist eins tot geboren. Die Herztöne waren schon kurz vor der Geburt schlecht gewesen. Die Geburt dauerte 14 Stunden. (Fall 110.) (8 Stunden vor der Entbindung sind die Kindesbewegungen

deutlich gefühlt; Herztöne nicht mit Sicherheit gehört, doch scheinen sie in der Tiefe links etwas oberhalb des Nabels hörbar zu sein. Nach 7 Stunden Blasensprung; Fruchtwasser verfärbt. Herztöne nicht mit Sicherheit zu hören. Die innere Untersuchung ergibt hintere Scheitelseiteinstellung mit Tiefstand der Vorderhauptes. Trotz der ungünstigen Einstellung des Kopfes besteht noch die Möglichkeit einer Spontangeburt. Die Frau hat sehr starke und häufige Wehen. Es erfolgt nach 18stündigem Kreissen die Spontangeburt eines kleinen bereits abgestorbenen Kindes. Kopf klein, leicht konfiguriert.)

Ein Kind wurde nach der äusseren Wendung auf den Kopf entbunden. Ein Kind ist mit Verletzungen entbunden: Druckmarken und Kopfgeschwulst. (Fall 107.) Es fällt somit ein Kind der Therapie zur Last. 1mal wurde die Geburt durch Nabelschnurvorfall kompliziert.

Wochenbettverlauf: Von den Müttern ist keine gestorben; gestört ist ein Wochenbett gewesen durch einmalige Temperatursteigerung bis 38,3°.

Operative Entbindungen (49).

Zange: Mit der Zange wurde die Geburt 2mal beendet, und zwar beide Male wegen der Gefahr von seiten der Mutter (Kontraktionsring oberhalb des Nabels und lange Dauer der Geburt). Die Wochenbetten verliefen normal.

Hohe Zange (1): Fall No. 118.

Perforation (8): Die Perforation wurde 8mal, darunter 1mal am absterbenden Kinde ausgeführt. 4mal wurde die Wendung versucht, aber ohne Erfolg, und es ist zur Perforation am nachfolgenden Kopfe geschritten worden. 1mal ist der Extraktionsversuch bei Fusslage auch erfolglos gewesen. Alle Wochenbetten verliefen ungestört.

Wendung und Extraktion (13): Die Wendung ist 3mal wegen Querlage ausgeführt worden; 4mal wegen ungünstiger Einstellung des Kopfes und 1mal wegen Armvorfall. Indikation zur Wendung von seiten des Kindes bestand 3mal. 3 Wochenbetten verliefen gestört. Von

den Kindern kamen 5 tot bzw. asphyktisch zur Welt. Eins von den toten Kindern ist mit $7\frac{1}{2}$ Monaten geboren. (Fall 134.)

Künstliche Frühgeburt (9): Die künstliche Frühgeburt wurde 9mal eingeleitet. Von den Kindern sind 5 nach kurzer Zeit gestorben. In 2 Fällen sind die Wochenbetten gestört gewesen. 1mal ist die Geburt durch Perforation beendet worden. (Fall 142.)

Extraktion bei Beckenendlage (4): Ein Kind ist durch Fraktur der rechten Klavikula und durch Impression des linken Scheitelbeins geschädigt worden.

Sectio caesarea (11): 11mal wurde die sectio caesarea vorgenommen. Die Kinder sind sämtlich lebensfähig geboren. Wochenbettsverlauf ist in 4 Fällen durch gelegentliche Temperatursteigerungen bis $38,8^{\circ}$ gestört worden.

Hebosteotomie (1): Kind asphyktisch wiederbelebt. Wochenbett krank. (Fall 118).

Resümee: Von den 49 Kreissenden ist keine gestorben. Von den Kindern starben 18: bei Spontangeburt 1, bei Perforation 8, bei Wendung 4, bei künstlicher Frühgeburt 5. Von den totgeborenen Kindern fällt eins der Therapie zur Last. 12 Wochenbetten sind gestört gewesen.

Vera 7,4—6,5 (24).

I. Erstgebärende (7).

Wendung (1): 1mal ist die Wendung bei Schädellage mit Armvorfall ausgeführt worden. Kind tot.

Sectio caesarea (6): 6mal wurde die sectio caesarea ausgeführt. Alle Kinder sind lebensfähig zur Welt gekommen. 3 Wochenbetten durch geringe Temperatursteigerungen gestört.

Resümee: Es starben somit von den 7 Kindern 1 (blass asphyktisch geboren, nach 1 Stunde wiederbelebt, nach 5 Stunden gestorben). Von den Müttern ist keine gestorben. 3 Wochenbetten sind gestört gewesen.

II. Mehrgebärende (17).

Wendung (3): 3mal ist die Wendung ausgeführt worden und zwar: 1mal bei Querlage und 2mal bei ungünstiger Einstellung des Kopfes. 2 Kinder sind gestorben. Wochenbettsverlauf normal.

Perforation (1): Die Perforation ist 1mal bei Cervixdehnung ausgeführt worden. Wochenbett normal.

Sectio caesarea (11): Alle Kinder lebend entbunden. Eine Frau ist 6 Stunden nach der Operation gestorben. Obduktionsbefund: Luftembolie des Herzens. (Fall 179.) 8 Wochenbetten sind gestört bzw. krank gewesen.

Extraktion bei Beckenendlage (2): 1mal nach der Extraktion mit Haken wurde am nachfolgendem Kopfe perforiert. Wochenbetten normal.

Resümee: Es starben somit 4 Kinder. Von den Müttern ist eine gestorben. 8 Wochenbetten gestört bzw. krank.

Vera 6,4—5 $\frac{3}{4}$ (3).

I. Erstgebärende (2).

Eine Erstgebärende ist mit Zange entbunden. Kind lebensfähig geboren. 1mal ist die sectio caesarea ausgeführt worden. Kind lebt. Wochenbett gestört.

II. Mehrgebärende (1).

1mal ist die Wendung gemacht worden. Kind tot.

Resümee: Von den 3 Kindern ist eins gestorben. Wochenbettsverlauf 1mal gestört.

Enge Becken ohne Angabe der c. v. oder c. d. (129).

I. Erstgebärende (25).

Spontangeburt (4): Die spontan geborenen Kinder sind sämtlich lebensfähig gewesen. Wochenbettsverlauf gut.

Operative Entbindungen (21).

Zange (13): Mit Zange sind 13 Frauen entbunden worden. Alle Kinder lebensfähig geboren. Wochenbetts-

verlauf bei allen Frauen normal. Die Indikation von seiten der Mutter bestand 5mal, von seiten des Kindes 7mal.

Wendung (2): Die Wendung ist 2mal wegen Nabelschnurvorfal ausgeführt worden. Ein Kind ist tot geboren. Wochenbettsverlauf normal.

Perforation (2): Ist 2mal ausgeführt worden und zwar 1mal wegen Gefahr von seiten der Mutter (placenta praevia) bei lebendem Kinde. Wochenbetten gut.

Extraktion bei Beckenendlage (2): Sie wurde 2mal vorgenommen wegen Lebensgefahr des Kindes.

Hohe Zange (1): Die hohe Zange ist einmal angelegt worden wegen Gefahr von seiten des Kindes. Kind lebensfähig geboren.

Sectio caesarea (1): Kind lebt. Wochenbett gestört.

Resümee: Von den 3 totgeborenen Kindern bei 25 Entbindungen sind 2 perforiert worden und 1 bei Wendung wegen Nabelschnurvorfal gestorben. Von den Müttern ist keine gestorben. Ein Wochenbett nach sectio caesarea gestört.

II. Mehrgebärende (104).

Spontangeburt (23): Von den 104 Mehrgebärenden kamen 23 spontan nieder. Sämtliche Mütter blieben am Leben. Ein Kind totgeboren (mazeriert, letzte Kindesbewegung vor 7 Tagen). Wochenbetten gut.

Operative Entbindungen (81).

Zange (15): Die Zange wurde 15mal angelegt und zwar 12mal wegen Gefahr von seiten des Kindes und 2mal wegen Gefahr von seiten der Mutter. Die Wochenbetten verliefen sämtlich normal. Alle Kinder lebensfähig entbunden.

Wendung (37): Die Wendung wurde 37mal ausgeführt. Wegen Querlage 6mal, wegen ungünstiger Einstellung des Kopfes 10mal. Die prophylaktische Wendung wegen placenta praevia wurde in einem Falle ausgeführt. 7 Kinder sind gestorben, davon 2 intra partum. Die Mütter sind sämtlich am Leben geblieben. Wochenbetten 2mal gestört.

Perforation (22): 22mal wurde perforiert. 5mal wegen Cervixdehnung, 2mal bei totem Kinde, 17mal nachdem andere Verfahren nicht gelungen waren (Zangen- und Wendungsversuche). Ein Wochenbett gestört.

Extraktion bei Beckenendlage (2): Dieselbe wurde 2mal ausgeführt. Ein Kind tot (Nabelschnurvorfall).

Künstliche Frühgeburt (1): Wegen placenta praevia wurde künstliche Frühgeburt eingeleitet und dieselbe mit Hystereuryse und Wendung ausgeführt. Kind lebt.

Sectio caesarea (1): Kind lebt. Wochenbett gestört.

Hohe Zange (3): Ein Kind ist gestorben. 2mal Verletzungen des kindlichen Schädels.

Resümee: 33 Kinder tot geboren, einschliesslich Perforation (22). Alle Mütter sind am Leben geblieben. Ein totgeborenes Kind fällt der Therapie zur Last (intra partum gestorben). Da die Geburten fast ausschliesslich in der Poliklinik ausgeführt sind, so ist die genaue Beobachtung der Wochenbetten unmöglich gewesen.

Nach der genauen Beschreibung dieser Fälle kann ich jetzt zu den eigentlichen Resultaten übergehen. Die Häufigkeit des engen Beckens stellt sich bei 322 Geburten dieses Zeitraumes auf 20%; eine Zahl, wie sie auch ähnlich von Franke für Dresden (24%), von Schwartz für Göttingen (22%), von Dorn für Königsberg (22%), von Joos für Zürich (20%) ermittelt worden ist.

Die Mehrgebärenden überwiegen in unserem Material beträchtlich, ebenso wie auch bei Baisch in Tübingen. Das Verhältnis stellt sich folgendermassen: 236 Pluriparae und 86 Erstgebärende, d. h. 73% : 27% (Baisch 72% : 28%).

Spontangeburt.

Unter den 322 Geburten bei engem Becken verliefen spontan 27%. Es ergibt sich somit dieselbe Tatsache, welche schon Heinsius betont hat, nämlich dass die scheinbare geringe Prozentziffer der Spontangeburt in Breslau im Vergleich mit anderen Kliniken davon abhängt, von welchem

Grade ab wir die verengten Becken rechnen. In dieser Arbeit werden nämlich zu den verengten diejenigen gerechnet, bei denen eine c. v. von 9,5 cm vorlag, während bei den anderen Autoren schon die Becken mit einer c. v. von 10 dazu gezählt werden. Jedenfalls im Vergleich zu Heinsius stellt sich die Ziffer auffallend gering. 43% : 27%.

Diesen Unterschied kann man dadurch erklären, dass bei Heinsius nur diejenigen Geburten berücksichtigt wurden, die in der Klinik vorgekommen sind. Kretschmer und Kapischke, die zu den verengten auch diejenigen von c. v. = 10 ab gerechnet haben, haben 38,5% und 57,7% zu verzeichnen.

In ganz gesetzmäßiger Weise nimmt mit dem Grade der Beckenverengung auch die Häufigkeit der Spontan- geburten ab:

Ich habe	dagegen Baisch
c. v. 9,5—8,5 in 50%	9%
c. v. 8,4—7,5 „ 37,5%	65%
c. v. 7,4—6,6 „ 0%	18%
c. v. 6,5—5 ³ / ₄ „ 0%	0%

Von den Erstgebärenden und Mehrgebärenden kamen spontan nieder:

Erstgebärende	Mehrgebärende
c. v. 9,5—8,5 = 68%	42,8%
c. v. 8,4—7,5 = 58%	28%

Es ergibt sich somit die schon längst bekannte Tatsache, dass bei Frauen, die öfters geboren haben, die Geburtshindernisse sich steigern.

Was das Verhältnis zwischen dem Grade der Beckenverengung zur Grösse des Kindes anbetrifft, so ist das grösste Kind bei c. v. 8,4—7,5 mit 5000 g Gewicht bei einer Erstgebärenden vorgekommen. Desgleichen 2 Kinder mit K. U. 39 bei einer Erstgebärenden und Mehrgebärenden. Durchschnittliche Grösse des Kopfumfanges bei c. v. 8,4—7,5, bei Erstgebärenden 35,4, bei Mehrgebärenden 32,3.

Im Vergleich zu den operativen Geburtsleitungen bei demselben Grade der Beckenverengerung: bei Erstgebärenden 35,7; bei Mehrgebärenden 35,4.

Was die Kindeslage anbetrifft, so sind bei sämtlichen Spontangeburt: 3 mal Querlagen bei Mehrgebärenden vorgekommen, bei denen die äussere Wendung auf den Kopf gemacht wurde (Fall 25, 62, 154); 6 mal ist die Spontangeburt bei ungünstiger Einstellung des Kopfes erfolgt und 2 mal bei Steisslage. Das Alter der Kreissenden bewegte sich zwischen 17 und 40 Jahren. Bei der jüngsten Kreissenden, einer Erstgebärenden, erfolgte die Geburt eines lebenden, 2890 g wiegenden Kindes nach 10 Stunden, bei c. v. = 9,5, nachdem sich der Kopf gut eingestellt hatte (Fall 8). Bei der ältesten Frau, einer 40jährigen IV gebärenden, dauerte die Geburt eines 3060 g wiegenden Kindes, bei derselben Beckenverengerung 12 Stunden.

Die Dauer der spontanen Geburten erwies sich durchschnittlich als 23,1 (Heinsius 23,3; Ludwig und Savor fanden 21,3; Litzmann 15,09; Knapp 21,8). Nach Winkel ist die Geburt im Mittel fast um die Hälfte länger als bei weiten Becken.

Über den Einfluss der Kindesgrösse und ein- und mehrmaligen Geburten auf die Dauer der Geburt mag die folgende Tabelle dienen.

	Primiparae	Multiparae
Kinder von normaler Grösse . . .	27 Std.	16 Std.
Sehr grosse und übertragene Kinder	(Heinsius 20 Std.)	(Heinsius 25,5 Std.)
Kleine und frühgeborene Kinder . .	15,5 Std.	19,3 Std.

Eine wichtige Komplikation, die sich nicht nur bei engem Becken geltend macht und die einen wesentlichen Einfluss bei Spontangeburt gehabt hat, ist der vorzeitige Blasensprung. Er wurde 23 mal beobachtet. Dies ergibt 7,9% (Heinsius 13,6%; Knapp 22,2%; Franke 19,8%).

	Primiparae	Multiparae
Spontangeburt . . .	1:29 = 3,2%	8:59 = 14,2%
Operative Entbindungen	6:57 = 10,5%	8:177 = 4,5%

Bei vorzeitigem Blasensprung verliefen also 9 mal die Geburten spontan und 14 mal operativ = 60,9%. Bei rechtzeitigem Blasensprung verliefen aber die Geburten bei Erstgebärenden in 96,8% spontan und bei Mehrgebärenden in 85,8%.

Zweitens zeigte sich auch bei dem vorzeitigen Blasensprung eine Beeinflussung der Mortalität der Kinder. Bei den 9 Spotangeburtten starb kein Kind, bei den 14 operativ beendeten Geburten starben 4 = 28,5% (Heinsius 27,26%).

Was den Ausgang der Spotangeburtten beim engen Becken betrifft, so wurden 89 Kinder spontan geboren, darunter 1 mal Zwillinge. Davon kamen 3 asphyktisch zur Welt, von denen 2 nach erfolglosen Belebungsversuchen gestorben sind. Zwei Kinder sind tot geboren. Dies ergibt eine Mortalität der Kinder von 3,4%; Heinsius 4,83%. In Wien Ludwig und Savor 7,3%; Braun und Herzfeld 1,8%; Knapp gibt von 41 Fällen 4,9% Mortalität der Kinder an; Toth (Budapest) 2,9%. Das grösste Kind, das spontan geboren wurde, wog 5000 gr, das kleinste 1700 g. Das Durchschnittsgewicht der Kinder betrug 2765 g. Knapp fand als Durchschnittsgewicht der spontan geborenen Kinder bei engem Becken bei Primiparis 2753 g, bei Pluriparis 3218 g. Franke (Dresden) fand bei Primiparen 3057 g, bei Pluriparen 3250 g. Ich fand das Durchschnittsgewicht bei Primiparen 2834 g und Pluriparen 2705 g. Heinsius fand das Durchschnittsgewicht der Kinder 3074 g und das Durchschnittsgewicht der Kinder der Primiparen 3036 g, der Pluriparen 3136 g. Verletzungen des kindlichen Schädels und des Kindes überhaupt sind 15 mal beobachtet worden, also in 17,2% der Fälle (Heinsius 27,4%). Diese Verletzungen bestanden teilweise in Druckmarken oder in bläulichen oder nekrotischen Streifen, nach deren Verlauf sich deutlich das Vorbeipassieren des Kopfes am Promontorium oder an der Symphyse nachweisen liess. Ausserdem sind zu den „verletzten“ Kindern auch diejenigen gerechnet, die mit Kopfgeschwülsten, asphyktisch oder paretisch zur Welt gekommen

sind. Im einzelnen stellen sich die Verletzungen des Kindes folgendermassen: Asphyxie 5 mal = 5,7 %, Facialislähmung 4 mal = 4,6 %, Druckmarken 3 mal = 3,4 %, Kopfgeschwülste 3 mal = 3,4 %.

Die Mortalität der Mütter betrug 0%.

Ausgesprochenes Fieber hatten 3 Wöchnerinnen. Eine einmalige vorübergehende Temperatursteigerung fand sich bei 4 Wöchnerinnen. Einmal Dammriss und 1 mal Clitorissriss. Einmal lässt sich als Ursache für die Temperatursteigerung Mastitis annehmen. Somit stellt sich die Prozentzahl der infolge der Geburt fiebernden Wöchnerinnen auf 11,2 %. 4 Fälle. (Heinsius 5 %, Ludwig und Savor 7,4 %, Knapp unter 41 Geburten 4,9 %, Toth (Budapest) 29,5 %).

Man braucht kaum zu erwähnen, dass im Vergleich zu den anderen Kliniken, die Endresultate bezüglich der Prognose für Mutter und Kind günstig gewesen sind. Ehe man aber die anderen Verfahren nicht besprochen hat, wäre es noch zu früh, etwaige Schlüsse daraus zu ziehen und über die prinzipiellen Arten der Geburtsleitung, d. h. über einen konservativen oder aggressiven Charakter derselben zu sprechen. Da ich solch eine Einteilung behalten will, um die Resultate für Mütter und Kinder anschaulich zu machen, so scheint es mir jetzt nötig, die Perforation zu beschreiben, bei der die Sorge für die Mutter im Vordergrund steht.

Perforation.

Ich bin jetzt genötigt, der Reihe nach die durch Perforation beendigten Geburten zu beschreiben. Es ist dabei zu unterscheiden, Perforation des lebenden und des toten Kindes. Vom ethischen Standpunkte aus ist die erstere mehrfachen Angriffen und vielseitiger Kritik ausgesetzt worden. Wollte man allein über diese Angriffe reden, so müsste man die Perforation des lebenden Kindes am Ende, d. h. nachdem man Erfahrungen in den anderen Entbindungsarten gesammelt hat, beschreiben, da ich aber andere Zwecke verfolge, so habe ich der Perforation die Stelle

gleich nach den Spontangeburt reserviert. Wenn ich einige sichere Schlüsse bekommen werde, so werde ich auch über den ethischen Standpunkt sprechen.

Um also wieder zu der eigentlichen Arbeit zurückzukehren, so ist die klare und einfache Indikationsstellung zur Ausführung der Kraniotomie am toten Kinde wohl für alle Schulen die gleiche und bedarf daher keiner besonderen Erörterung. Es möge nur erwähnt werden, dass mit Rücksicht auf die günstige Prognose des Eingriffes, bei vorher nicht infizierten oder verletztem Geburtskanal die Indikation bei sicher konstatiertem Tod des Kindes und engem Becken möglichst freigebig zu stellen wäre, um die Entbindung in der für die Mutter schonendsten und raschesten Art zu beenden. Was die Indikation zur Perforation am lebenden Kinde betrifft, so müssen wir es zunächst dem freien Gutdünken des Einzelnen überlassen.

Die Perforation wurde 46 mal ausgeführt, also in 15,2% aller Fälle bei engem Becken. Heinsius gibt an 8,6%. Der Unterschied erklärt sich wieder durch Verschiedenartigkeit unseres Materials. In der Klinik ist die Operation bei 134 Fällen 11 mal gemacht worden, also in 8,2%; es stellt sich somit dieselbe Ziffer, wie bei Heinsius. Knapp gibt eine Frequenz von 21,1% an, Ludwig und Savor 13,3%. Unter den Perforationen wurde 9 mal nach vorangegangener Wendung oder Wendungsversuch perforiert; nach vorangegangener Wendung oder Wendungsversuch bei ungünstiger Einstellung des Kopfes 5 mal: bei Querlage 7 mal; wegen abnormer Grösse des Kindes wurde 2 mal perforiert; nach versuchter künstlicher Frühgeburt 5 mal; bei Nabelschnurvorfall 10 mal; bei ungünstiger Einstellung des Kopfes 2 mal; bei Cervixdehnung 5 mal; nach vergeblichen Zangenversuchen 3 mal. Zweimal hat die Frau eine beckenenerweiternde Operation abgewiesen.

Von den Müttern starb 1 (Fall 52) [c.v. 8 $\frac{3}{4}$ —9 mit dem Zirkel gemessen. Allgemein verengtes Becken, IV. para; die 2 ersten Partus Perforation; III. para künstliche Frühgeburt: Blasensprung vorzeitig. I. Schl. mit linkem Arm-

vorfall. Die Frau weist die Sectio caesarea, sowie die beckenerweiternde Operation ab. Deswegen Wendungsversuch, dabei inkomplette Uterusruptur. 2 Stunden nach der Entbindung exitus letalis.] Mortalitätsprozent = 2,5%. (In Wien Bürger 6%.) 3 Mütter fieberten (= 6,7%). Von diesen kamen 2 von aussen in die Klinik, während bei der dritten die Operation in der Poliklinik gemacht wurde. Das ist im Vergleich zu den Spontangeburtten fast um das Doppelte weniger.

Es bleiben mir jetzt nur, um ein vollkommen anschauliches Bild bezüglich der Prognose für Mutter und Kind zu gewinnen, die übrigen Operationsverfahren mit Ausnahme der Sectio caesarea und der beckenerweiternden Operationen zu beschreiben. Damit werde ich imstande sein, die dritte und vierte Frage zu beantworten, nämlich: Wie verschiebt sich die Mortalität und Morbidität von Mutter und Kind, wenn in das abwartende Verfahren, die Zange, Wendung und künstliche Frühgeburt eingeschaltet werden und sind dieselben imstande, die Perforation des Kindes zu ersetzen oder wenigstens einzuschränken?

Zange.

Unter 322 Fällen musste 45 mal die Geburt durch Anlegung der Zange beendet werden = 14,9% (Heinsius 20,8%; Knapp 16,19%; Braun und Herzfeld 17,5%) und zwar 25 mal bei Erstgebärenden = 28,5% und 20 mal bei Mehrgebärenden = 9,4%.

Während wir im allgemeinen beim engen Becken gerade bei den Erstgebärenden mehr Spontangeburtten zu verzeichnen haben als bei Mehrgebärenden, finden wir hier ein Überwiegen der Zangenoperationen bei den ersten. Der Umstand also, dass nämlich bei den Erstgebärenden die wenig dehnungsfähigen Weichteile in Verbindung mit der oft eintretenden Wehenschwäche den raschen Austritt des Kindes verhindern und damit eine Gefahr für das kindliche Leben hervorrufen können, findet hier auch eine Bestätigung.

Als Indikation zur Zange von seiten der Mutter sind in mehreren Fällen Dehnungserscheinungen der Cervix beobachtet worden, ferner Albuminurie und Herzfehler. Die Indikation zur Zange bestand von seiten der Mutter 19 mal = 26,6%; von seiten des Kindes 23 mal = 74,4%. Viermal wurde die Zange bei vorzeitigem Blasensprung angelegt; 2 mal ist die hohe Zange angelegt worden. In vielen Fällen wurde die Zangenoperation mit Hofmeyerscher Impression verbunden. 3 mal ist Dammriss geschehen, 1 mal Cervixriss bei Zange aus Beckenenge. 2 mal sind Muttermundinzisionen gemacht worden, dabei erfolgte 1 mal eine Impression des linken Parietalbeines. 2 mal im Beckeneingang (Kinder asphyktisch geboren), 2 mal in Beckenenge und 2 mal in der Beckenweite, dabei 1 mal bei vorzeitigem Blasensprung und 1 mal bei fast eröffnetem Muttermund (Kind asphyktisch geboren). Von den Müttern fieberten 5. Eine hat einen Tag nach der Entbindung Eklampsie bekommen. Dieselbe ist gesund nach Hause entlassen. Es ist also bei 13,9% das Wochenbett gestört gewesen (Heinsius gibt an 13% krank, Kapischke 29,41%). Von den Müttern ist keine gestorben.

Von den Kindern sind 3 totgeboren und 2 einige Zeit nach der Geburt gestorben. Es starben also 10,7% (Heinsius 14,2%, Kapischke 11,77%).

Die hohe Zange wurde 5 mal wegen Gefahr von seiten des Kindes angelegt. Ein Kind ist nach langer Zeit gestorben und 1 ist asphyktisch zur Welt gekommen, aber wiederbelebt worden. 1 mal erfolgte Dammriss II. Grades, 1 mal Wochenbettfieber.

Es stehen mir zu wenig Fälle zu Gebote, als dass ich mir über die hohe Zange ein Urteil bilden könnte, jedenfalls ist sie in allen Fällen mit Leichtigkeit ausgeführt worden und dabei sind die Kinder mit Ausnahme von einem gerettet worden. Ich muss deshalb Kapischke, der auch einige günstige Fälle zu verzeichnen hat, zustimmen, dass die Prognose der hohen Zange, hinsichtlich der Kindermortalität, sowie der mütterlichen Morbidität

und Mortalität, nicht so pessimistisch darzustellen ist, wie es viele Autoren behaupten. Küstner ist der Ansicht, dass nur die höhere Dexterität die hohe Zange auszuführen berechtigt ist. Knapp hebt hervor, dass er bei hoher Zange nur 17,7% tote Kinder hatte und dass es ein verhältnismässig günstiges Resultat für die Kinder ist, wenn man die Gefährlichkeit dieser Operation in Betracht nimmt. Baisch findet bei einer grösseren Zusammenstellung aus verschiedenen Kliniken bei 285 Entbindungen mittels hohen Forceps 4,2% mütterliche und 43,8% kindliche Mortalität. Kretschmar fand die Mortalität der Kinder mit 33,3%.

Folgende Zusammenstellung ergibt sich:

Autor	Mortalität	
	mütterliche	kindliche
Toth	10	20,50
Clemens	11	22
Stuhl	13	50
Dimitrieff	—	26
Schieck	11	56,1
Wahl	—	21
Schmid	15	38,4
Nagel	3	28,5
Lissewitz	—	32,43
Bürger (Wien)	1,3	38,5

Bürger ist der Ansicht, dass die hohe Zange nicht geeignet ist, ein grösseres Missverhältnis zwischen Kopf und Becken mit gutem Erfolg für Mutter und Kind zu überwinden. Sie muss demnach für Fälle leichter Beckenverengerung reserviert bleiben, in welchem die Indikation zur Geburtsbeendigung von seiten der Mutter eintritt und wo eine andere Art der Entbindung nicht angezeigt erscheint. Man wird aber nicht stets auf dieser Entbindungsmethode verharren können, allein um das kindliche Leben zu retten, sondern man wird sich stets bewusst sein müssen, dass bei grösseren Schwierigkeiten an ihre Stelle die Kraniotomie des Kindes zu treten hat, um die Mutter vor grösseren Gefahren zu schützen.

Wendung.

Die Wendung auf den Fuss wurde 66mal ausgeführt = 21,4% (Heinsius 10,6%; Knapp gibt 16,19% an; Weidling 21%; Winkel 10%; Bürger 6,6%).

Sie fand 4mal bei Erstgebärenden und 62mal bei Mehrgebärenden statt. Das Verhältnis ist also wie 7,8:92,2. Es ist somit wieder die Tatsache bewiesen, dass die Mehrgebärenden den geburtshindernden Momenten mehr ausgesetzt sind. Bei der Zange hat sich das umgekehrte gezeigt und wir haben es durch die weitaus überwiegenden Gefahren von seiten des Kindes erklärt (67,4:2,9), hier aber haben wir einerseits mit Komplikationen zu tun, die bei Zangenentbindungen gar nicht in Betracht kommen. (Querlage; Vorfall der kleinen Teile u. a.) und andererseits mit der viel häufigeren Gefahr von seiten der Mütter. Während bei Zangenoperationen Gefahr von seiten der Mütter in 2,09% bestand, ist sie bei Wendungen in 33,8% der Fälle beobachtet worden. Bei vorzeitigem Blasensprung ist die Wendung 2mal gemacht worden = 3,2%. Beidesmal wurde der vorzeitige Blasensprung bei Mehrgebärenden beobachtet. Künstlich wurde die Blase in 11 Fällen gesprengt = 17,6%.

Bei den übertragenen Kindern wurde die Wendung 2mal gemacht = 3,2%.

Die Indikationen zur Wendung waren: Querlage, ungünstige Einstellung, Nabelschnurvorfal oder Vorfall kleiner Kindesteile. In 2 Fällen kann man als Indikation zur Wendung neben Nabelschnur und Vorfall kleiner Teile auch die placenta praevia mitrechnen.

Die Wendung wurde stets erst bei vollkommen oder nahezu vollkommen erweitertem Muttermund ausgeführt. Prophylaktisch wurde, entsprechend den Grundsätzen meines hochverehrten Lehrers, Herrn Geheimrat Küstner, nicht gewendet und die Geburt stets gleich mit Extraktion beendet.

Die Wendung bei Querlage wurde 12mal vorgenommen = 19,3%; bei ungünstiger Einstellung des Kopfes 20mal

= 32,2%; bei Nabelschnurvorfal 18mal = 29%; bei Vorfal der kleinen Teile 9mal = 14,5%. Gefahr von seiten des Kindes bestand 31mal = 50%; von seiten der Mütter in 33,8% der Fälle.

Die Kinder erlitten in 7 Fällen = 11,2% Verletzungen (Fraktur der Extremitäten, Impression des Schädels); asphyktisch sind 23 Kinder geboren = 37%. Die Mütter haben in 9 Fällen Verletzungen bekommen = 14,5%, dabei 2mal Dammriss III° und 3mal Dammriss II°; einmal ist Cervixriss entstanden. Die durchschnittliche Geburtsdauer bei Wendung ist 31 Stunden gewesen; die kürzeste Geburtsdauer 7 Stunden und die längste 72 Stunden. Die Wendung wurde mehrmals nach vergeblichen Repositionsversuchen gemacht und mehrmals nach den Hoffmeierschen Impressionsversuchen. Bei der künstlichen Frühgeburt ist die Wendung 4mal gemacht worden; nach mehrstündiger Walcherscher Hängelage 3mal. 2mal wurde der Hysterurynter vor der Wendung eingelegt. 1mal ist die Wendung bei Partus praematurus gemacht worden. 11mal ist die Perforation am nachfolgenden Kopfe, da die Extraktion des Kindes nach der Wendung misslang, ausgeführt worden.

Von den Müttern starb keine, es fieberten 3 (nur dem klinischen Material entnommen) = 12,5%. Heinsius fand 28,5%; Ludwig Savor 16%; Rosenthal hatte unter 102 durch Wendung bei engem Becken Entbundenen 79,4% afebrile Wochenbetten. Von den Kindern starben 18 = 29%. Heinsius 28%; bei Braun-Herzfeld finden sich 59,6%; bei Rosenthal 63,7%; bei Ludwig und Savor 49,7% lebend entlassener Kinder. Dabei ist bei den letztgenannten Autoren die Kindesmortalität bei Erstgebärenden, infolge der durch die wenig vorbereiteten Weichteile entstehenden Schwierigkeiten, bedeutend höher (39,7%); während sie bei den Mehrgebärenden nur 25,6% beträgt. In meiner Statistik fällt die Kindesmortalität bei Erstgebärenden auf. 25% (2mal bei Erstgebärenden, bei

denen die Wendung gemacht wurde) und bei Mehrgebärenden auf 27,5 % (16mal bei 58 Mehrgebärenden).

Die Resultate der Wendung in bezug auf die Kindermortalität sind verhältnismässig günstig im Vergleich zu den Zahlen aus anderen Kliniken zu nennen. Jedenfalls muss auch der Umstand in Betracht gezogen werden, dass in den anderen Kliniken auch die prophylaktische Wendung gemacht wurde. Um aber dieser das Wort zu reden, müssten die Resultate erheblich günstiger sein.

Künstliche Frühgeburt.

Die künstliche Frühgeburt gehört schon zu den Operationsverfahren, die den relativen Kaiserschnitt, sowie die beckenerweiternde Operation zu ersetzen imstande ist. Sie findet in der Beschreibung ihren Platz vor den letzteren Operationen einmal deswegen, weil wir, von den Spontan-geburten an beginnend, allmählich zu denen übergehen, welche für die Frau ungünstigere Prognose darbieten, und andererseits, weil sie, nachdem die Methoden der Ausführung sich verhältnismässig einfach gestaltet haben, in der Poliklinik ausgeführt werden kann.

Sie wurde 11mal, d. h. bei 3,4 %; (Heinsius 20,5 %, Kapischke 6,3 %) aller Fälle von Geburten bei engem Becken und bei 4,6 % aller durch Operation beendeten Geburten ausgeführt. (Heinsius 33,7 %.) In der Habilitationsschrift von Keilmann 1898 und der Dissertation von Silbermann 1902, die in hiesiger Klinik gemacht worden sind, finde ich ganz interessante Angaben über Indikation und praktische Ausführung der künstlichen Frühgeburt. In den meisten Fällen ist die Hystereuryse in Anwendung gebracht, in dem Bestreben, der Natur möglichst zu folgen. In unseren 10 Fällen ist sie stets benützt. Dass die Methode den grössten Anforderungen genügt, dafür spricht die Tatsache, dass bei Silbermann von den 47 Frauen, die mit der Methode entbunden wurden, alle vollkommen gesund geblieben sind. Ein Vorwurf, der der Hystereuryse im allgemeinen von vielen Geburtshelfern gemacht wird,

nämlich, dass durch den Hystereurynter sehr leicht eine Verschiebung der Kindeslage zustande komme, findet in den Fällen, die mir zu Gebote stehen, einmal die Bestätigung. Das Kind ist aber lebensfähig nach 10stündigem Kreissen zur Welt gekommen. Silbermann hat unter 47 Fällen 2mal derartige Verschiebungen zu verzeichnen, das ist also in 4,2% der Fälle. Dieselbe Tatsache betont auch Hannes, der auch bei 68 Fällen, die der Breslauer Klinik entnommen sind, 2 derartige Verschiebungen zu verzeichnen hat. Die 2 Fälle müssen aber als Ausnahmefälle zu bezeichnen sein, weil es bei vielen anderen die Verschiebung der Längslagen bei erhaltener Fruchtblase sich leicht durch äussere Handgriffe korrigieren liess, oder die Längslage nach einiger Zeit sich von selbst wiederherstellte. Dabei ist es auch zu bemerken, dass in den beiden Fällen die tiefsitzende Placenta und der unerwartete grosse — für das Becken zu grosse — Kopf die Schuld an dem Misslingen bei der Wiederherstellung der ursprünglichen Lage trägt. Wenn man sich aber die weitaus grösseren Gefahren bei der Bougierung, einmal die häufige partielle Ablösung der Placenta und zweitens Zerreissungen der Fruchtblase überlegt, so ist der Umstand nicht so ernst zu nehmen.

Die künstliche Frühgeburt wurde bloss bei Mehrgebärenden ausgeführt. 19mal in der Klinik und 1mal in der Poliklinik. 4mal sind die Kinder in der Schädellage geboren und 4mal in Querlage. 4mal ist die Blase künstlich gesprengt worden und 1mal ist sie vorzeitig gesprungen. Was die Ursache dazu war, lässt sich jetzt schwer sagen. In einem Falle ist es, wegen Platzens des Kolpeuryntes notwendig gewesen, einen zweiten einzulegen. Die Frau bekommt Dauerkontraktionen des Uterus. Nach zwölfstündigem Kreissen musste die Geburt mit Wendung und Extraktion und 1mal durch Wendung und Armlösung beendet werden.

Zweimal ist die Geburt durch Armvorfall kompliziert worden; 1mal durch Dauerkontraktionen des Uterus und 1mal durch drohende Asphyxie des Kindes.

Einmal bestand placenta praevia. In 2 Fällen sind während der Geburt Temperatursteigerungen bis 38° beobachtet worden. 1 Kind ist asphyktisch geboren. Die Mütter erlitten 2mal Verletzungen in Gestalt von Dammrissen.

Ausgesprochenes Fieber wurde bei keiner der Frauen beobachtet. In 2 Fällen ist eine geringe einmalige Temperatursteigerung gemessen worden (also in 20 %) (Heinsius 11 %; Kapischke 27 %; Chrobak 14,6 %; Knapp 50 %; Ludwig und Savor 14,6 %; Leopold und Konrad 28,5 %).

Von den Kindern sind 4 nach wenigen Stunden gestorben. 40 %. Heinsius fand 34,4 % der totgeborenen bzw. post partum gestorbenen Kinder; Kapischke 36,4 %.

Die Erfolge in anderen Kliniken waren:

Wien Chrobak	54 %	tote und gestorbene Kinder
Sarvey	28,4 %	" " " "
Bar	25,8 %	" " " "
Schädel	36,6 %	" " " "
Rumpe	34 %	" " " "
Braun und Herzfeld . .	38 %	" " " "
Leopold	36,6 %	" " " "
Calderini	26,08 %	" " " "
Bürger	47 %	" " " "
Peham	39 %	" " " "

Von den Müttern starb keine, ebenso wie auch in den Fällen von Kapischke. Heinsius gibt ein Fall von Tod der Mutter an, den er jedoch nicht als Folge der Geburt bezeichnet, sondern mit fettiger Degeneration des Herzmuskels begründet. Bürger hat in seiner Statistik 1 Todesfall der Mütter zu verzeichnen, das ist 2,9 %. Peham berechnet die Mortalität der Mütter auf 0 %; Ludwig und Savor 2,1 %; Leopold und Konrad 1,2 %; Eli Möller 1,2 %.

Die Gesamtergebnisse der künstlichen Frühgeburt mittels Hystereuryse müssen bezüglich der Prognose für die Mütter

als günstig bezeichnet werden, bezüglich der Prognose für das Kind aber als nicht so günstig. Wenn man aber die Resultate der künstlichen Frühgeburt mit den früheren Geburten bei denselben Frauen vergleicht, so gewinnen wir einen besseren Eindruck. Hier finden wir, dass die zehn Mehrgebärende in der vergangenen Zeit 80% tote und 20% lebende Kinder geboren haben. Bürger führt auch ähnliche Zahlen an (63,2% und 37,7%), Heinsius fand, dass bei denselben Frauen bei künstlich eingeleiteter Geburt die lebendgeborenen bzw. am Leben gebliebenen Kinder 56,65% betragen und die totgeborenen bzw. später gestorbenen Kinder 43,35% betragen haben; dagegen bei nicht künstlich eingeleiteter Geburt die lebenden Kinder 35,9% und die toten Kinder 64,1% betragen. Ich möchte noch kurz nach den Resultaten, die Silbermann gefunden hat, über die nötige Widerstandsfähigkeit der Kinder in den ersten Lebensjahren sprechen. Es ergab sich, dass von 14 von 28 lebend entbundenen Kindern, von denen etwas in Erfahrung zu bringen war, 10 am Leben geblieben; das älteste war 6½ Jahr, das jüngste 7 Monate. Diese Kinder haben zum Teil sehr schwere Erkrankungen durchgemacht, zum Teil waren sie überhaupt noch nicht krank. Die anderen 4 Kinder starben im Alter von 9 Wochen, 11 Wochen, 3—4 Monaten bzw. 16 Wochen. Unter diesen 4 Kindern befinden sich noch 2 uneheliche, deren Prognose ja an und für sich, sobald sie die Klinik verlassen, schlecht ist. Von den aus der Klinik lebend entlassenen Kindern sind also, soviel sich ermitteln liess, 28,5% im 1. Lebensjahre gestorben, ein nur unwesentlicher Unterschied gegenüber dem Resultat Heymanns von 24,1%. Nach diesen Resultaten dürfte die häufige Anwendung dieser Operation, trotz aller Vielseitigkeit der Komplikationen, wohl als berechtigt erscheinen.

Sectio caesarea.

Nach der Besprechung dieser prophylaktischen Massnahmen, wie man sie mit Recht zum Vergleich mit den

eigentlichen chirurgischen nennen kann, wenden wir uns jetzt zu den beiden letzten geburtshilflichen Verfahren, zur Sectio caesarea und zu den beckenenerweiternden Operationen. Somit kommen wir schon zu denjenigen Verfahren, die mit Verletzung der mütterlichen Teile einhergehen müssen, um das kindliche Leben zu retten.

Es erhebt sich nun die Frage, ob man nicht trotz der durch diese Entbindungsart gesetzten Verletzungen der mütterlichen Weichteile und der daraus folgenden Gefahren für die Mutter optimistisch sehen soll, weil die Prognose für das Kind so überaus günstig ist, ja vielleicht dadurch allein das Kind am Leben erhalten werden kann. Ja, vielleicht sind auch die Gefahren für die Mutter gar nicht so gross, als dass man sie nicht, um das Kind zu retten, wagen sollte. Letzteres wäre allerdings genau zu überlegen, denn in erster Reihe ist natürlich das Leben der Mutter zu berücksichtigen.

Was die Ausführung der Sectio caesarea betrifft, so muss ich gleich von Anfang an betonen, dass unter den Bedingungen für die Ausführung derselben keinerlei Untersuchung ausserhalb der Klinik noch nicht vorgenommen wurde. In zwei Fällen ist die Blase bei plötzlich und ganz überraschend eingetretenen Wehen gesprungen, aber die Frauen sind draussen nicht untersucht worden (Fall 181 und 86). Wenn ich gleich zu den Fällen den Wochenbettsverlauf hinzufüge, so hat sich derselbe in beiden Fällen fast fieberfrei gestaltet.

Was die Indikation betrifft, so kann ich alle meine Fälle zu den relativen rechnen, wenn man sich an die alten Begriffe „relativ“ und „absolut“ hält. Ausgenommen davon sind 6 Fälle, weil der einzige noch übrige Weg zur Geburtsbeendigung die Perforation des lebenden Kindes war, die in einer gut eingerichteten Klinik heutzutage nicht in Betracht gezogen werden darf. Früher verstand man unter „relativ“ und „absolut“ die Möglichkeit resp. Unmöglichkeit, die Geburt in anderer Weise zu beenden. Nachdem sich aber die Prognose der Sectio caesarea so wesentlich gebessert hat, kann man

wohl dem Olshausenschen Vorschlage folgen und, wo man früher über relative Indikation gesprochen hat, heutzutage von einer absoluten reden, indem man lediglich dass Interesse der Mutter berücksichtigt.¹⁾ Einmal wurde die Sectio caesarea durch eine vor 4 Jahren vorgenommene Blasenscheidenfisteloperation indiziert und 1 mal durch drohende Ruptur des Uterus. Der Kaiserschnitt wurde 37 mal ausgeführt, also in 11,4 % aller Fälle, die in diesem Zeitraum vorgekommen sind, 10 mal bei Erstgebärenden (27,6 %) und 27 mal bei Mehrgebärenden (72,4 %) [Chrobak 2,6 %, Knapp 9,5 %, Franke 4,5 %]. Bezüglich der Häufigkeit der Ausführung dieser Operation in Wien (Chrobak) mag die folgende Tabelle dienen.²⁾

Jahr	Zahl der engen Becken	absolute	relative Indikation
1903	240	1	10 = 4,16 %
1904	254	—	7 = 2,75 %
1905	147	1	5 = 3,40 %
1906	244	1	6 = 2,46 %

Die Dauer der Wehen vor der Operation schwankt zwischen 2 und 48 Stunden, jedoch betrug sie meistens 3—6 Stunden, da die zweite Hälfte der ersten Geburtsperiode mit Rücksicht auf den Zustand der Cervix und die Kontraktionsfähigkeit des Uterus von Küstner als der geeignetste Zeitpunkt für die Ausführung der Sectio angesehen wird.

In 9 Fällen haben wir starke Blutungen zu verzeichnen, 2 mal durch Placenta p. caes. In 2 Fällen war die Ursache Atonia; in 1 Falle Placenta praevia caesarea et atonia und in 2 Fällen die grosse Dicke und Hyperämie der Uteruswände.

Fünf asphyktische Kinder kommen bei Placenta praevia caesarea vor = 39,3 % (Banasz 41,6 %, Thomas 83,5 %).

¹⁾ Olshausen: „Der Kaiserschnitt nach seinem heutigen Standpunkte.“

²⁾ Peham: „Das enge Becken.“

In 2 Fällen wurde die Sterilisation der Frauen durch die Excision der Tuben und Vernähung der Stümpfe mit dem Peritoneum bewirkt.

Von den Kindern sind 3 mit Kopfgeschwülsten und 7 asphyktisch geboren. In 1 Falle hat sich der Kopf schon dem Beckeneingang adaptiert (Fall 188). Nach der Geburt des Kindes zeigten sich deutliche Druckmarken am Schädel. 2 Kinder sind gestorben, 1 19 Tage post partum (Fall 96). Todesursache: Oedema phlegmonosum pedis sin. Intumescencia lienis; Gastroenteritis catarrhalis, Nephritis parenchymatosa; Myocarditis; ductus Botalli opertus; Intumescencia gland. mesenterii. Wenn wir diesen Fall also abrechnen, so haben wir die Kindesmortalität $1 = 2,8\%$. (Heinsius 0% ; Kretschmer 0% ; Kapischke 9% ; Bürger $1,7\%$).

Die Kindesmortalität kann sich somit nur mit der Mortalität der Kinder bei Spontangeburt vergleichen. Es ist auch ohne Ausnahme der Spontangeburt das beste Resultat, das erzielt werden konnte. Was das Wochenbett betrifft, so waren 14 Wochenbetten als krank zu bezeichnen und 13 als gestört $= 36,1\%$. Bürger $17,2\%$.

Diese relativ grosse Morbidität ist vielleicht auf Erkrankungen der Respirationsorgane während des Wochenbettes zurückzuführen; denn die sehr günstigen Resultate bei der Wundheilung und das fast regelmässige Ausbleiben von Adhäsionen des Uterus, auch nach mehrfachen Operationen bei denselben Frauen (Fall 156, 161, 163, 180) deuten darauf hin, dass die Involution der Genitalien nicht wesentlich gestört sein konnte. In 2 Fällen haben wir mit ausgesprochener Erkrankung an Bronchopneumonie durch Narkosenwirkung zu tun. 1 mal hat die Kreissende Albuminurie und 1 mal Anasarca gehabt. Die Fäden wurden meistens am 14. Tage herausgezogen. Nur in 2 Fällen bestand eine Dehizens der Bauchnarbe und im Falle 96 waren 8 Nähte vereitert.

Die Mortalitätsziffer beträgt $1-2,2\%$ (Fall 165). (Bürger $2,5\%$; Döderlein $1,8\%$.)

Wenn wir nach dieser Auseinandersetzung noch einmal zu der Frage übergehen, welche Lage diese Operation im Vergleich zu den anderen Operationsverfahren bezüglich der Prognose für Mutter und Kind einnimmt, so erscheint uns der Kaiserschnitt bei der grossen Morbidität der Frau als recht gefährlich. Wenn wir auch keine grossen Mortalitätsverhältnisse haben, so scheint es mir doch als gerechtfertigt in jedem einzelnen Falle sich zu überlegen, ob man der Frau zur Operation raten und sie den Gefahren derselben aussetzen soll, oder ob es doch nicht besser wäre, die Geburt durch einen anderen operativen Eingriff zu beendigen.

Wenn die Verhältnisse der Asepsis in der Poliklinik sich besser gestalten würden, so könnte man wohl durch den Kaiserschnitt die Perforation des lebenden Kindes ganz ausschalten.

Beckenerweiternde Operationen.

Die beckenerweiternden Operationen in Form von Hebo-
steotomie sind (7 mal) in dem Material vertreten = 2,3 %.
(Heinsius 3,5 %; Kretschmer 0,8 %.) Bei diesen beiden
sind sie nur in Form von Symphyseotomie vertreten. Die
Resultate derselben sind sehr günstig für Mutter und Kind
gewesen. Was die Hebo-
steotomie betrifft, so wurde sie
3 mal bei Erstgebärenden und 4 mal bei Mehrgebärenden
ausgeführt und zwar bei c. d. = 11; 10,5 und $9\frac{3}{4}$ und
c. v. = $8\frac{3}{4}$ —9 (2 mal) und 2 mal bei c. v. = 7,5—8.

Die Geburt wurde 3 mal mit Zange beendet. 2 mal
mit Wendung; 1 mal mit Episiotomie. 1 mal ist man ge-
nötigt gewesen, vor der Wendung Muttermundincisionen zu
machen. Die Möglichkeit der spontanen Geburtsbeendigung
ist in 3 Fällen durch meconiumhaltiges Fruchtwasser,
1 mal durch träge Wehen, 2 mal durch Albiminurie und
1 mal durch Kontraktionsring in Nabelhöhe erschwert worden.
1 mal ist die Geburt durch Cervixriss kompliziert worden.
Stärkere Blutungen sind nicht beobachtet worden. 3 mal

sind die Kinder asphyktisch geboren. Die Dauer der Geburt beträgt durchschnittlich 20 Stunden.

Die Kindesmortalität bezieht sich nur auf 1 Fall, bei dem das Kind bloss asphyktisch geboren und nach 24 Stunden gestorben ist; somit ist das in 14,2% der Fälle (Heinsius 20%). Die kindliche Mortalität beläuft sich bei anderen Autoren für die Symphyseotomie: Zweifel 8,8%, Morisani 5,4%, Pinard 10%; für die Hebosteotomie: Bürger 4,3%, Döderlein bei 225 Fällen von Hebosteotomie 6,67%.

Wie sich die Verhältnisse für die Frau gestalteten, so muss man dieselben als recht ungünstig bezeichnen. Zwar haben wir ein ziemlich kleines Material zur Verfügung, aber dennoch müssen wir daraus unsere Schlüsse ziehen. In 7 Fällen von Hebosteotomie sind die Wochenbetten sämtlich als krank zu bezeichnen. Die Heilung des Knochens ist in 4 Fällen mit und in 2 Fällen ohne Kallusbildung erfolgt. Bei der Entlassung, die durchschnittlich nach 52 Tagen erfolgte, ist in 1 Falle Descensus der vorderen Vaginalwand beobachtet worden. Bürger fand die Morbidität des Wochenbettes für Symphyseotomie und Hebosteotomie zusammen als 43,4%. Die Mortalität von Müttern beträgt 0%.

Wenn wir einen Rückblick auf das Ganze werfen und dabei die Grenzen der Beckenverengung, bei denen noch die Geburt ohne Schädigungen sowohl für die mütterlichen Weichteile, als auch für das Kind selbst entstehen können, in Betracht nehmen, so können wir auch die Indikation zur Ausführung derselben erblicken. In den Fällen von c. v. bis 7—6% wäre die Beckenerweiterung der Sectio caesarea gleichzustellen oder die erste wäre sogar berufen, die letztere einzuschränken. Der ungünstige Wochenbettsverlauf aber spricht sehr viel gegen die becken-erweiternden Operationen. Wenn auch die letzteren imstande wären, die Perforation des lebenden Kindes zu umgehen, so bleibt jedenfalls in den Fällen, wo die septische Infektion der Kreissenden sicher vermutet werden kann, und wo die Mutter die Ausführung der Porroschen Operation verweigert, nichts übrig, als bei dringender In-

dikation zur Entbindung von seiten der Mutter das kindliche Leben durch Verkleinerung des Schädels zu opfern.

Extraperitonealer Uterusschnitt (nach Sellheim).

In der letzten Zeit bin ich imstande gewesen, 3 Fälle, bei denen die Nichtkeimfreiheit der inneren Genitalorgane sicher vermutet werden konnte, und bei denen deswegen der extraperitoneale Kaiserschnitt gemacht wurde, zu beobachten. Die Mitteilungen von Sellheim über die günstigen Resultate, die er mit dieser Methode in 2 Fällen gehabt hat, haben Küstner Anlass gegeben, sich auch damit zu befassen. Die Vielseitigkeit von Gefahren, die der klassische Kaiserschnitt mit sich bringt, und die damit verbundene Einschränkung der Indikation bei septischer Infektion der inneren Genitalien, sind schon lange für viele Forscher Ursache gewesen, sich nach neuen Methoden umzusehen. Die beckenerweiternden Operationen, die beim engen Becken nur allein in Betracht gezogen werden können, sind nur bei gewissen Grenzen der Beckenverengerung ausführbar, und andererseits durch den statistisch nachgewiesenen ungünstigen Wochenbettverlauf, auch in den Fällen septischer Infektion, nicht gern anwendbar. Ausserdem haben auch die beckenerweiternden Operationen dem abdominalen Kaiserschnitt gegenüber den Nachteil, dass sie nur den Geburtsweg vorbereitende Operationen sind, welche dem Kinde noch ein schweres Geburtstrauma zumuten. Somit hat man einen relativ ungefährlichen Weg gefunden, nämlich den Austritt des Kindes im Uterushals, der vorher vom Peritoneum abpräpariert wird.

Die Idee, das Kind unmittelbar über der Schosssfuge ans Licht der Welt zu betördern, stammt von Joerg (1833). Ritgen, Physik und Baudeloque der Neffe haben das Verfahren zu verbessern gesucht. Frank (1906) hat das Verdienst, nach langer Zeit der Vergessenheit, den alten Gedanken wieder aufgegriffen zu haben.

Ich erlaube mir die 3 Krankengeschichten näher zu beschreiben:

Fall I No. 99. 26jährige I. para; enges Becken c. v. von 8 cm. 24stündige Geburtsdauer. Blasensprung vor 3 Tagen. Ziemlich enge Genitalien. Graviditas mens X. Kopf über dem Becken in Hinterscheitelbeineinstellung. Herztöne regelmässig, wenn auch mitunter recht beschleunigt gewesen (168 in der Minute). Ein spontaner Eintritt des Kopfes in das Becken ist nicht mehr zu erwarten. Muttermund — kleinhandtellergröss. In Betracht kommt Hebosteotomie oder cervikaler Kaiserschnitt. Mit Rücksicht auf die engen, straffen Genitalien erscheint letzteres Verfahren angezeigt. Suprasymphysärer Fascienquerschnitt knapp 3 Querfinger über der Symphyse. Im ganzen etwa 2 bis mehr cm lang. Abtrennung der Fascie von den Recti. Trennung der Recti. Die Harnblase ist mit 200 cm³ gefüllt. Scheitel deutlich. Ablösen des Peritoneums von der Unterfläche der Recti, genaues Einschneiden über der Blase und von hier aus wieder Abtrennen des Peritoneums von der oberen Blasenwand und von der vorderen Bauchwand. An einer ganz unbedeutenden Stelle wird dabei das Peritoneum eröffnet. Diese Stelle wird zuerst durch Klemme, später durch Nähte versorgt. Nach Abtrennen des Blasenperitoneums vom Cervix wird dieser schliesslich freigelegt und, nachdem die Freilegung ergiebig genug erscheint, longitudinal eingeschnitten. Im Bereich der oberen Schnittpartie kommt man in dicke Uterusmuskulatur, die leicht blutet. Nach unten davon äusserst dünne und mürbe Muskulatur, die bei stumpfer Gewalt auseinanderweicht. Nach Eröffnung der Cervix wird der Kindskopf von der Scheide aus hineingedrängt und zum Uterusmunde herausentwickelt. Dabei verschafft man dem Hinterhaupt den Vortritt. Blass asphyktisches Kind. Nachwasser stinkt. Kind nach 10 Minuten völlig wiederbelebt. Placenta nach einiger Zeit durch Credé vollständig herausbefördert. Uterusnaht: 4—5 Knopfnähte, dann fortlaufend. Einige Nähte, welche die Plica an die Blase befestigen. Fortlaufende Naht der Recti: Integument-Fascienschluss durch acht Nähte.

Im Wochenbett starke, übelriechende Eiterung aus der Wundhöhle und teilweise Fasciennekrose. Heilung in etwa 4 Wochen. Die Cervix ist an die Narbe fixiert, das Corpus rehoflektiert.

Fall II No. 100. I. para; schwer rhachitisch, c. v. $8\frac{1}{2}$. Kopf über dem Beckeneingang in guter Stellung. Cervixdehnung bereits bemerkbar. Wehen seit ungefähr zwölf Stunden. Kind geschädigt. Blasensprung vorzeitig. F. 38,6. Operation wie bei I. Anfüllung der Blase mit 150 cm^3 . Nachdem die Blase sich bereits vom Peritoneum abgehoben hat und das Peritoneum in tadelloser Weise sowohl von der Blase, als auch bereits von einem Teil der Cervix sich getrennt hat, geschieht links neben dem Urachus, der noch nicht unterbunden ist, wie im Fall I, ein Einriss. Das Peritoneum wird weiter, wie bei Fall I, von der Plica vesica uterina abgeschoben und der Uterus längs incediert. Es gelingt nur mit Mühe durch kombinierte Handgriffe von der Scheide und den Bauchdecken aus den Kopf zu entwickeln. Dabei reißt zum Teil die schützende Peritonealnaht, die sofort wieder hergestellt wird. Tamponade und Wundversorgung. Kind asphyktisch, bald wiederbelebt. Die Kranke stirbt am 3. Tage an Infektion. Sektion ergibt: Peritonitis im vorderen Douglas. Beginnende Abscessbildung einmal zwischen Fascie und Muskel im Bereich der Fascienablösung, ferner zwischen Muskel und Peritoneum parietale im Bereich der Schnittwunde. Uterusinnenfläche absolut einwandfrei; der Cervixschnitt liegt in der Mitte zwischen innerem und äusseren Muttermunde, ist nur noch 3 cm lang und tadellos aseptisch verklebt.

Fall III. No. 101. Die Frau kreisst seit etwa 24 Stunden. I. para c. v. $8\frac{1}{2}$ cm. Fruchtwasserabfluss vor 4 Stunden, Muttermund nahezu erweitert. Kopf über dem Beckeneingang. Sehr bedeutende Cervixdehnung. Herztöne schwankend. Cervikaler Kaiserschnitt wie im Fall I und II. Am schwersten ist es den Blasenscheitel zu finden und diesen gegen das Peritoneum zu trennen.

Auch da passiert wieder eine kleine Eröffnung des Peritoneums. Ferner ist es schwer, in genügender Weise den Cervix vom Peritoneum zu entblößen, wegen der gleichmässigen Verbindung der Blase mit Peritonealfalte. Die mediane Schnittfläche liegt 1 Querfinger unter der Symphyse. Herausbeförderung des Kindes nicht ohne Schwierigkeiten. Uterusschnitt nicht weiter gerissen. Kind asphyktisch, wiederbelebt. Wochenbett durch Bauchdeckenabscess gestört. Riechende Lochien. Entlassung nach 16 Tagen.

Alle diese Operationen sind nach Sellheims Vorschrift ausgeführt. Die Füllung der Blase flacht die plica vesiconterina durch den Zug am Bauchfell ab und zerrt sie nach oben, somit wird der extraperitoneale Teil des Uterushalses auf Kosten des intraperitonealen Abschnittes länger. Dasselbe geschieht in der Schwangerschaft. Der wachsende Uteruskörper zieht das Bauchfell nach oben. Somit kann der ganze Uterushals im Beckenbindegewebe liegen und auch die Blase kann vom Peritoneum soweit abgelöst werden, dass die Umschlagstelle des Bauchfelles ihre oberste Kuppe noch gerade zu erreichen vermag. Es kommt also hier im wesentlichsten in Betracht das Abschieben des Peritoneum von der Blasenkupe. In allen 3 Fällen ist das schwierig gewesen, dabei ist die Peritonealfalte eingerissen worden. Die Entwicklung des kindlichen Schädels ist auch mit Schwierigkeiten verbunden gewesen. Der Ausgang dieser Operation scheint uns bezüglich der Morbidität und Mortalität von Müttern wenig zu befriedigen. Der Fall II besonders ist dazu angetan, die Leistungsfähigkeit des suprasymphysären Kaiserschnittes nicht zu hoch einzuschätzen. Es scheint die grosse operative Verwundung bei einer sicher infizierten Kreissenden lebensgefährlich zu sein, mag die Verbreitung der Infektion peritoneal oder phlegmonös im Bindegewebe erfolgen. Dabei ist es auch schwer, bei dem Sellheimschen Kaiserschnitt das Peritoneum ganz unversehrt von der Blasenkupe zu trennen, somit ist auch die Grundidee der Methode gar nicht erfüllt. Es erhellt daraus, dass wir vorläufig

noch wenig gegen die Perforation des lebenden Kindes anwenden können! Nach diesen Überlegungen können wir uns nunmehr über die Stellung der Kraniotomie am lebenden Kinde in gesetzlicher und wissenschaftlicher Beziehung äussern.

Kraniotomie am lebenden Kinde.

Diese Kategorie von Fällen bedarf schon deshalb einer besonderen Besprechung, weil in den letzten Jahren Stimmen laut wurden, welche ihr überhaupt jede Berechtigung absprechen und sie auch vom gesetzlichen Standpunkte aus verpönen. Denn abgesehen davon, dass die katholische Kirche die Tötung des Kindes im Mutterleibe unbedingt verwirft, sind wir auch von seiten des Staates zu mindestens gegen die Möglichkeit einer Bestrafung nicht sicher (Kossman). Es gibt auch Mediziner, die der Operation eine Berechtigung absprechen und dem Kinde im Mutterleibe als lebenden Menschen das erste und höchste aller Menschenrechte, das Recht auf Leben zusagen. Zu den letzten gehört auch Pinard, der unter keinen Umständen die Tötung des Fötus für erlaubt hält. Kossman betont, dass die beiden dem Arzte anvertrauten Leben als gleichwertig anzusehen sind, „dass nach Statistiken berechnet im Sinne der wahrscheinlichen Lebensdauer das Leben einer 23jährigen Mutter dem eines Neugeborenen an Wert gleichsteht“.

Alle diese theoretischen Überlegungen verlieren ihren Sinn, wenn wir uns zur praktischen Ausführung unserer Aufgabe begeben. Denn in den Fällen, wo keine andere Entbindungsart möglich ist, bleibt uns nichts übrig, als entweder die Frau ganz abzuweisen, und erst den Tod des Kindes abzuwarten, welcher oft erst nach eingetretener Uterusruptur erfolgen könnte, also unter Umständen, die für die Mutter auch mit der höchsten Lebensgefahr verbunden wären. Wenn man die Erhaltung des Lebens der Mutter als nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft und unentbehrlichen Teil der Familie, wägt gegen die

Chancen zur Erhaltung des Lebens des noch nicht geborenen Kindes, dass sogar im ersten Lebensjahre in 25 % zugrunde geht, so können wir, wie ich glaube, den Eindruck gewinnen, dass das mütterliche Leben nicht riskiert werden soll. Auf diesem Standpunkte stehen auch die meisten Geburtshelfer. Wurden doch auf dem letzten Gynäkologenkongress Stimmen laut, dass man bei einer infizierten Kreissenden auch nicht die Hebosteotomie machen darf. Derselben Ansicht ist auch Küstner, der bei einer veritabel infizierten Kreissenden, bei der Unmöglichkeit in nicht operativer Weise die Geburt zu beendigen, die Perforation des lebenden Kindes allein in Betracht zieht, um der Mutter einige Chancen zu verschaffen. Zweifel führt an, „dass zur Kraniotomie des lebenden Kindes nur eine zureichende Notwendigkeit, eine unverkennbare Lebensgefahr der Mutter, wie drohende Uterusruptur, Tympanie, Fieber usw., führen könne“. In ähnlicher Weise äussern sich auch andere Geburtshelfer. In der neuesten Auflage seines Lehrbuches sagt Schauta, „dass es Ausnahmefälle gibt, in denen auch heute noch die Kraniotomie am lebenden Kinde notwendig ist“. Olshausen—Veit sagen, „dass man über die theoretische Berechtigung, um das Leben der Mutter zu retten, das Kind zu verkleinern, ebensowenig zu diskutieren brauche, wie über das Streben, diese Eventualität auf eine möglichst geringe Zahl der Fälle zu beschränken“. Und so verstossen wir bei der Ausführung der Perforation gewissermassen stets gegen die Strafgesetze, was die Staatsanwaltschaft doch stillschweigend dulden muss, und es wird gegen keinen Arzt die Anklage erhoben, solange nicht Verdachtsgründe bestehen, dass derselbe die Perforation aus einem anderen Grunde, als um das Leben der Mutter zu retten, vorgenommen hat.

Es erhebt sich auch gleich eine andere Frage, nämlich, ob der Mutter das Recht zusteht, die Perforation des lebenden Kindes zu verlangen? In der neuesten Zeit, wo wir über soviel Mittel verfügen und wo die Asepsis auf einer recht hohen Stufe steht, ist die Frage etwas schwer zu beantworten.

Einerseits muss doch der Frau das Recht gewahrt bleiben, irgend einen Eingriff, welcher die Integrität ihres Körpers verletzt, abzulehnen; andererseits ist auch das Kind nur als ein Teil der Mutter anzusehen, über den sie unbedingt verfügen kann. Es ist in keiner Weise möglich, Pinard zuzustimmen, dass, wenn sich die Frau hat schwängern lassen, sie damit auch die Gefahren übernimmt, welche die Geburt als solche mit sich bringt, und sich auch den Gefahren der Operationen, welche zur Rettung des Kindes dem Arzte eventuell notwendig erscheinen, unterziehen muss. Ja, es könnten aber doch solche sein, die über den Zustand ihres Beckens gar nicht orientiert sein könnten. Ferner handelt sie auch im Zustande der Notwehr, wenn sie die Tötung des Kindes fordert. Abgesehen davon kann auch die Mutter, gequält von den lange anhaltenden Geburtsschmerzen, körperlich und psychisch deprimiert werden, in einem Zustande verminderter Zurechnungsfähigkeit sich befinden. Es kann wohl kein Zweifel darüber bestehen, dass das Verlangen der Mutter nach der Tötung des Kindes im Mutterleibe nicht als strafbar anzusehen ist. Desto schwerer wird es für den Arzt sein, zu entscheiden, ob diesem Verlangen stattzugeben sei oder nicht. Es könnten auch derartige Momente vorkommen, die für das ärztliche Handeln nicht in Betracht gezogen werden können, zum Beispiel eine uneheliche Schwängerung als Ursache zur Tötung des Kindes. Somit steht der Arzt vor einer Menge von Fragen, die ihn zu der oder jener Alternative führen könnten. Der Arzt darf, wie Zweifel sagt: „die Kranken zu diesem oder jenem für notwendig erachteten Eingriff bewegen, nie aber darf er sich solche Eingriffe, die gegen sein Gewissen und gegen die allgemeinen Grundsätze gehen, von den Kranken befehlen oder aufnötigen lassen. Der Arzt hat in erster Linie die Pflicht, so viel als möglich Leben zu erhalten und nur dann ein Kind zu opfern, um die Mutter zu retten, wenn sonst Mutter und Kind verloren wären.“ Es wird sehr viel vom Takte des Arztes abhängen und von der Art

und Weise, wie er die Frau zu einer besseren Ansicht zu bringen versucht. Er wird es verstehen müssen, auf die Psyche der Frau einzuwirken, sie von der Inhumanität ihres Verlangens zu überzeugen, um von ihr die Einwilligung zur Vornahme einer das kindliche Leben rettenden Operation zu erhalten. Man wird sich freilich bei der Auswahl der Methode klar sein müssen, dass dieselbe möglichst gefahrlos für die Frau zu gestalten und die Indikation möglichst sicher zu beurteilen ist. Es scheint, als ob Kaiserschnitt und Beckenerweiterung in Fällen, wo die Keimfreiheit der inneren Genitalien sicher vermutet werden kann, imstande wären, ohne grosse Gefahr für die Mutter, das Kind vor der Kraniotomie zu bewahren. Trotzdem sind noch auch immer Fälle vorhanden, in denen die Perforation des lebenden Kindes sich als notwendig erweisen wird, und hier fällt dem Arzt sogar die Verpflichtung zu — entgegen den Gesetzen der Kirche und des Staates — nur geleitet von seinem ärztlichen und menschlichen Empfinden, die Operation vorzunehmen.

Am Schluss möchte ich noch einen Gesamtüberblick über die Leistung der Klinik in diesem Gebiete vom Jahre 1894 bis 1907/08 darstellen. Mögen die Tabellen auf SS. 98—101 dazu dienen.

Herrn Geheimrat Küstner sowie Herrn Oberarzt Dr. Hannes sei an dieser Stelle für die Anregung zu dieser Arbeit und ihre Durchsicht ergebenst gedankt.

Literaturverzeichnis.

1. Heyman: „Über Methode und Indikation der künstlichen der Schwangerschaft.“ Arch. f. Gyn. 1889. Bd. 59, II.
2. Edwin Silberman: „Die Einleitung der Frühgeburt mittels Hystereuryse.“ Inaug.-Dissert. Breslau 1902.
3. Keilman: „Klinisch-experimentelle Beobachtungen über künstliche Erregung von Geburtswehen.“ Habilitationsschrift. Breslau 1898.
4. Olshausen: „Der Kaiserschnitt nach seinem heutigen Standpunkte.“
5. Banasch: „Die Stellung des Kaiserschnitts zu konkurrierenden Verfahren auf Grund der Operationsresultate der letzten Jahre.“ Inaug.-Dissert. Breslau 1907.
6. Thomas: „Die Indikationsstellung und Technik des Kaiserschnitts.“ Inaug.-Dissert. Breslau 1902.
7. Karl Baisch: „Reformen in der Therapie des engen Beckens.“ Leipzig 1907.
8. Oskar Bürger: „Die Geburtsleitung bei engem Becken.“ Wien 1908.
9. H. Peham: „Das enge Becken.“ (Eine Studie über den Geburtsverlauf und die Indikationen zu operativen Eingriffen.) Wien und Leipzig 1908.
10. Fritz Heinsius: „Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1894/95—1896/97.“ (Eine klinisch-statistische Studie.) Inaug.-Dissert. Breslau 1898.
11. Kretschmer: „Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1897/98—1899/1900.“ Inaug.-Dissert. Breslau 1907.
12. Kapischke: „Die Geburten bei engem Becken in den Jahren 1901/02—1902/03.“ Inaug.-Dissert. Breslau 1907.
13. Sellheim: „Der extraperitoneale Uterusschnitt.“ Zentralblatt f. Gyn. No. 5. 1908.
14. Kossman: „Indikation und Recht zur Tötung des Fötus.“ Die Heilkunde. Januar 1902. Heft I.
15. Olshausen-Veit: „Lehrbuch der Geburtshilfe.“ 1899.
16. Hannes (Breslau): „Beiträge zur Anwendungsweise der Hystereuryse.“ Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie. 1905.

Tabelle I. Sämtliche klinischen und poliklinischen Geburten

	A n z a h l				Mortalität der Kinder			
	Heinsius 94—96 95	Kretschmer 97—99 98	Kapische 00—02 01	Kohn 03—05 04	94—96 95	97—99 98	00—02 01	03—05 04
Spontan	61	45=38,5%	261=57,7%	88	3	4	12=11%	3
Tiefe Zange	18	12=12%	17=8,6%	45	3	1	2=11,5%	6
Hohe Zange		14=12,9%	5	5		5	1	1
Manualhilfe b. Becken- endlage	3		10=2,9%	13	0		7=62,5%	3
Wendung u. Extraktion	7	18=15%	52=20%	66	3	6	22=42,5%	19
Künstliche Frühgeburt	29		22	11	10		8	6
Handgriff der Siege- mundin			2				0	
Kaiserschnitt	8	11	11	36	0	0	1	2
Perforation	8	14=13,8%	20=4,2%	45	8	14	20	45
Laparatomie wegen Uterusruptur			3	0			2	0
Pubiotomie				6				1
Äusserliche Wendung				2				0
Episiotomie				1				0
Cervikaler Kaiser- schnitt nach Sellheim				3				0
Summe	139	115	403	321	28—19,7%	30	75	86

	c v. 6,5 u. darunter				Primiparae				Multi			
	94—96 95	97—99 98	00—02 01	03—05 04	94—96 95	97—99 98	00—02 01	03—05 04	94—96 95	97—99 98	00—02 01	03—05 04
Spontan		0	0	0	13=27%	123=44%	29		32=72,5%			
Tiefe Zange		0	0	1	6=50%	8	25		6=50%			
Hohe Zange		0	0	0	7=57,5%	1	1		7=42,5%			
Manualhilfe b. Becken- endlage			0	0		1	2					
Wendung u. Extraktion		0	0	1	2=16%	6	4		15=83,6%			
Künstliche Frühgeburt			0	0		1	0					
Handgriff der Siege- mundin			0			2						
Kaiserschnitt		0	0	1	2	4	10		9			
Perforation		0	0	0	10=70,5%	9	8		4=29%			
Laparatomie wegen Uterusruptur			0			0						
Pubiotomie							3					
Äusserliche Wendung							0					
Episiotomie							1					
Cervikaler Kaiser- schnitt nach Sellheim							3					
Summe		0	0	3	41=37,5%	155=28%	86		73=62,3%			

bei engem Becken mit und ohne Angabe der c. d. oder c. v.

Erkrankungen und Störungen i. Wochenbett				Mortalität der Mütter				c. v. 10—9,6		c. v. 9,5—8,6			c. v. 8,5—7,6			c. v. 7,5—6,6		
10 4 1 2 8 3 4 37	2 1 3 2 6 4 5 18	27 5 0 1 5 4 5 55	10 4 1 5 2 28 3 64	0 0 0 0 1 3 2 6	0 0 0 0 0 2 2 4	0 0 0 0 0 5 0 7	0 0 0 0 0 1 1 3	9 3 1 2 0 0 0 19	51 2 0 3 0 0 0 57	21 2 4 9 11 7 2 7 45	141 5 2 11 7 0 4 177	37 8 0 3 1 3 7 1 70	2 1 0 2 18 6 3 12	41 2 3 1 13 3 13 100	24 8 1 4 14 14 2 2 1 94	0 0 1 0 4 3 0 4	2 0 0 0 4 5 1 15	0 0 0 4 4 17 1 0 0 0 24

parae		Beckenendlagen				Ungünstige Schädellagen				Querlagen			
00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03	00—02 01—03
138 = 55%	59	1	0	5	3	0	0	4	12	0	0	0	1
9	20	0	0	0	0	1	0	1	5	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	11	4	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	62	0	0	0	1	0	17	22	3	0	13	12	12
21	11	6	4	0	1	0	0	0	1	0	9	4	4
0			0					1			0		
7	26	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1
11	37	0	0	1	1	0	4	11	1	0	0	7	7
3			0					1			1		
	3			1					1			0	0
	2			0					0			1	1
	0			0					0			0	0
	0			0					1			0	0
248 = 65%	236	11 = 7,7%	0	19	16	4 = 2,8%	0	28	56	5 = 3,6%	0	23	26

Tabelle II. Sämtliche klinischen und poliklinischen Ge

	A n z a h l			Mortalität der Kinder		
	Kretschmer 97—99 98—00	Kepischke 00—02 01—03	Kohn 02—06 04—07	97—99 98—00	00—02 01—03	02—06 04—07
Spontan	32 = 40 $\frac{0}{0}$	235 = 67,31 $\frac{0}{0}$	61	3	7 = 29,8 $\frac{0}{0}$	2
Tiefe Zange	6 = 7,5 $\frac{0}{0}$	9 = 2,52 $\frac{0}{0}$	17	0	1 = 11 $\frac{0}{0}$	6
Hohe Zange	10 = 12,5 $\frac{0}{0}$	5 = 1,43 $\frac{0}{0}$	1	3 = 33,3 $\frac{0}{0}$	1 = 20 $\frac{0}{0}$	0
Manualhilfe bei Becken- endlage		8 = 2,29 $\frac{0}{0}$	7		6 = 75 $\frac{0}{0}$	2
Wendung und Extraktion	13 = 16,25 $\frac{0}{0}$	36 = 10,32 $\frac{0}{0}$	27	4 = 30,8 $\frac{0}{0}$	15 = 71,6 $\frac{0}{0}$	10
Künstliche Frühgeburt. .		22 = 6,30 $\frac{0}{0}$	10		8 = 36,4 $\frac{0}{0}$	6
Handgriff d. Siegemundin		2 = 0,57 $\frac{0}{0}$	0		0	0
Kaiserschnitt	11 = 13,75 $\frac{0}{0}$	11 = 3,15 $\frac{0}{0}$	35	0	1 = 9,1 $\frac{0}{0}$	2
Perforation	8 = 10 $\frac{0}{0}$	18 = 5,15 $\frac{0}{0}$	21	8	18	21
Laparatomie wegen Uterus- ruptur		3 = 0,86 $\frac{0}{0}$	0		2	0
Pubiotomie			6			1
Äusserliche Wendung . .			1			0
Episiotomie			1			0
Sellheimsche Operation .			3			0
Summe. . .	80	349	190	18 = 22,5 $\frac{0}{0}$	59 = 16,9 $\frac{0}{0}$	50

	c. v. 7,5—6,6			c. v. 6,5 und darunter			Primiparae		
	97—99 98—00	00—02 01—03	02—06 04—07	97—99 98—00	00—02 01—03	02—06 04—07	97—99 98—00	00—02 01—03	02—06 04—07
Spontan	0	2	0	0	0	0	10 = 31,25 $\frac{0}{0}$	112 = 47,66 $\frac{0}{0}$	25
Tiefe Zange	0	0	0	0	0	1	3 = 50 $\frac{0}{0}$	5	12
Hohe Zange	1	0	0	0	0	0	4 = 40 $\frac{0}{0}$	1	0
Manualhilfe bei Becken- endlage		1	2		0	0		0	0
Wendung und Extraktion	0	4	4	0	0	1	1 = 7,7 $\frac{0}{0}$	6	2
Künstliche Frühgeburt. .		2	0		0	0		1	0
Handgriff d. Siegemundin		0	0		0	0		2	0
Kaiserschnitt	3	5	17	0	0	1	2 = 18,2 $\frac{0}{0}$	4	10
Perforation	0	1	1	0	0	0	6 = 75 $\frac{0}{0}$	8	6
Laparatomie wegen Uterus- ruptur		0	0		0	0		0	0
Pubiotomie			0			0			3
Äusserliche Wendung . .			0			0			0
Episiotomie			0			0			1
Sellheimsche Operation .			0			0			3
Summe . .	4	15	24	0	0	3	26 = 32,5 $\frac{0}{0}$	139 = 39,83 $\frac{0}{0}$	62

burten bei engem Becken mit Angabe der c. v. oder c. d.

Erkrankungen und Störungen im Wochenbett			Mortalität der Mütter			c. v. 10,0—9,6			c. v. 9,5—8,6			c. v. 8,5—7,6		
$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$
1	25	11	0	0	0	9	51		21	141	37	2	41	24
0	3	4	0	0	0	3	2		2	5	8	1	2	8
1	0	1	0	0	0	5	0		4	2	0	0	3	1
	1	2		0	0		1			3	1		3	4
2	4	4	0	0	0	2	3		9	11	8	2	18	14
	6	2		0	0		0			7	1		13	9
	1	0		0	0		0			0	0		2	0
4	4	27	2 = 18,2%	5	1	0	0		2	3	3	6	3	14
3	5	1	2	0	1	0	0		7	4	7	1	13	13
	0	0		2	0		0			1	0		2	0
		6			0						4			2
		0			0						1			0
		0			0						0			1
		3			1						0			3
11	50	61	4	7	3	19	57		45	177	70	12	100	94

Multiparae			Beckenendlagen			Ungünstige Schädelagen			Querlagen		
$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$ $\frac{0}{0}$
22 = 68,75%	123 = 52,34%	36	0	5	2	0	4	8	0	0	1
3 = 50%	4	5	0	0	0	0	1	2	0	0	0
6 = 60%	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	7		8	7		0	0		0	0
12 = 92,3%	30	25	0	0	0	0	13	11	0	7	6
	21	10		4	0		0	0		9	3
	0	0		0	0		1	0		0	0
9 = 81,8%	7	25	0	0	0	0	0	2	0	0	0
2 = 25%	10	15	0	0	1	0	3	6	0	0	2
	3	0		0	0		1	0		1	0
		3			1			1			0
		1			0			0			1
		0			0			0			0
		0			0			1			0
54 = 67,5%	210 = 60,17%	129	0	17	11	0	23	32	0	17	13

Lebenslauf.

Ich Stefan Kohn, mosaischer Konfession, wurde am 10. Januar 1884 als Sohn des prakt. Arztes Eduard Kohn in Nasielsk, Gouvernement Warschau in Russland, geboren und bin russischer Staatsangehöriger. Ich besuchte das Gymnasium in Czenstochau und machte mein Abiturium im Juni 1903. Michaelis 1903 wurde ich an der Warschauer Universität als Student der Medizin immatrikuliert, woselbst ich 4 Semester verblieb. Darauf ging ich nach Breslau und studierte hier 6 Semester Medizin.

In meiner Studienzeit habe ich Vorlesungen folgender Professoren und Dozenten besucht:

In Warschau: *Bewad, Chmielewsky, Darcyrow, Gendre, Jaschtschinsky, Kolossow, Koualewsky, Krassusky, Nassonow, Schalfiejew, Silow, Wulff.*

In Breslau: *Abbeg, Anschütz, Bonhoeffer, Czerny, Dienst, Filehne, Flügge, Garrè, Goebel, Groenouw, Hannes, Hasse, Hinsberg, Hürthle, Jensen, Küstner, Küttner, Krause, Ladenburg, Lesser, Müller, Neisser, Ponfick, Röhmman, Sachs, Schaper †, Schäffer, Stern, v. Strümpell, Uhthoff, Winkler, Ziegler.*

Allen diesen meinen verehrten Lehrern spreche ich meinen Dank aus.
